

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет
имени Марата Оспанова.

Кафедра: Доказательной медицины

Специальность: Акушерство и Гинекология

РОДЫ ЧЕРЕЗ ВЛАГАЛИЩЕ ПОСЛЕ ПРЕДЫДУЩЕГО КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Выполнила: Закарияева Молдир, Лесхан Мадина.

Проверила: Назарбаева Р.К.

Актобе
2019 год.

**Протокол: Утвержден протоколом заседания
Экспертной комиссии по вопросам
развития здравоохранения
№ 18 МЗ РК от 19 сентября 2013 года
«Роды через влагалище после предыдущего
кесарева сечения»**

Ссылка: http://www.rcrz.kz/docs/clinic_protocol/

Список разработчиков протокола с указанием квалификационных данных:

* Патсаев Т.А., д.м.н., заведующий операционного блока НЦАГиП

Рецензенты:

* Укыбасова Т.М. – д.м.н., профессор, руководитель отдела акушерства и гинекологии АО «ННЦМД».

Недостатки протокола:

1. В данном протоколе не учитывается тот факт, через какой интервал времени, лучше всего было бы рожать женщинам с рубцом на матке после предшествующего кесарево сечения, чтобы организм мог полностью восстановиться.
2. Отсутствие сносок, ссылок для быстрого перехода на использованную литературу.
3. В создании протокола участвовали только врачи акушер-гинекологи, при отсутствии их коллег: анестезиологов-реаниматологов.
4. В создании протокола участвовал только один разработчик.
5. Данный протокол №18 МЗ РК от 19.09.2013 требует пересмотра, в связи с истечением срока.

РІСО

Р – женщины с рубцом на матке

І – роды через естественные родовые пути


С – оперативное родоразрешение

О – угроза разрыв матки

Вопрос: Приводит ли к угрозе разрыва матки роды через естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке по сравнению с оперативным родоразрешением ?

№ 18 МЗ РК от 19 сентября 2013 года

«Роды через влагалище после предыдущего кесарева сечения»



О проекте ▾ Электронная клиника ▾



Для пациентов ▾ Справочники ▾

Войти

Роды через влагалище после предыдущего кесарева сечения

Также: Н-О-022



РЦРЗ (Республиканский центр развития здравоохранения МЗ РК)

Версия: Клинические протоколы МЗ РК - 2013

Категории МКБ: Роды через влагалище после предшествовавшего кесарева сечения (O75.7)

Разделы медицины: Акушерство и гинекология

Общая информация

Версия для печати

Скачать или отправить файл

Краткое описание

Утвержден протоколом заседания
Экспертной комиссии по вопросам развития здравоохранения
№ 18 МЗ РК от 19 сентября 2013 года

Родоразрешение через естественные родовые пути после предыдущего кесарева сечения. Роды через естественные родовые пути с рубцом на матке могут проводиться в стационарах, имеющих возможность постоянного мониторинга за состоянием роженицы и плода в родах и проведения экстренного КС круглосуточно, причем время от появления показаний к кесареву сечению до начала операции не должно превышать 15 минут (2 и 3 уровень регионализации перинатальной помощи).

Разделы

На главную

Название протокола: Роды через влагалище после предыдущего кесарева сечения

Шаг 2. Поиск информации.

Ключевые слова в Pubmed: Cesarean section, Vaginal birh after Cesarean, Uterine Rupture, Pregnancy Outcome

NCBI Resources How To Sign in to NCBI

PubMed cesarean section Vaginal Birth after Cesarean Uterine Rupture Pregnancy Outcome 搜索

Create RSS Create alert Advanced Help

文献类型
Format: Summary

Text availability
Abstract

Free full text
Full text

出版日期
5 years
10 years
Custom range.

Species
Humans
Other Animals

Clear all
Show additional filters

Best matches for cesarean section Vaginal Birth after Cesarean Uterine Rupture Pregnancy Outcome:

Vaginal birth after cesarean: an effective method to reduce cesarean.
Sabol B et al. Clin Obstet Gynecol. (2015)

Pregnancy and delivery after a cesarean section.
Vääräsmäki M et al. Duodecim. (2017)

[Analysis of factors affecting vaginal birth after cesarean].
Wu SW et al. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi. (2016)

Switch to our new best match sort order

Filters activated: Clinical Trial, Free full text, published in the last 5 years, Humans. Clear all to show 238 items.

A cluster-randomized trial to reduce major perinatal morbidity among women with one prior cesarean delivery in Québec (PRISMA trial): study protocol for a randomized controlled trial.
Chaillet N, Bujold E, Masse B, Grobman WA, Rozenberg P, Pasquier JC, Shorten A, Johri M, Beaudoin F, Abenhaim H, Demers S, Fraser W, Dugas M, Blouin S, Dubé E, Gauthier R; PRISMA Trial Research Group.
Trials. 2017 Sep 20;18(1):434. doi: 10.1186/s13063-017-2150-x.
PMID 28931404 Free PMC Article
Similar articles

类似文献
[Lower Uterine Segment Trial: A pragmatic open multicenter rando [Gynecol Obstet Fertil Senol. 2.

Review Vaginal birth after cesarean: new insights. [Evid Rep Technol Assess (Full .

Review Delivery for women with a previous cesarean: guide [Eur J Obstet Gynecol Reprod Bi.

The Maternal-Fetal Medicine Units Cesarean Registry: safety and [Am J Obstet Gynecol. 2006

Review Vaginal birth after cesarean delivery. [Clin Perinatol. 2008

See reviews...
See all.

Related information
References for this PMC Article

Free in PMC

Search details

- Randomized Controlled Trial
- Research Support, American Recovery and Reinvestment Act
- Research Support, N.I.H., Extramural
- Research Support, N.I.H., Intramural
- Research Support, Non-U.S. Gov't
- Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.
- Research Support, U.S. Gov't, P.H.S.
- Research Support, U.S. Government
- Retracted Publication
- Retraction of Publication
- Review
- Scientific Integrity Review
- Systematic Reviews
- Technical Report

文献类型

clear

- Clinical Trial**
- Review
- Customize

Прямой

Text availability

clear

- Abstract
- Free full text**
- Full text

出版日期

clear

- 5 years**
- 10 years
- Custom range

Species

clear

- Humans**
- Other Animals

[Clear all](#)

[Show additional filters](#)

Ключевые слова в Trip: Cesarean section, Vaginal birh after Cesarean, Uterine Rupture, Pregnancy Outcome

Home About How To Use Contact us Blog Tour Latest & greatest Evidence Maps (NEW!) Sign Up or use your account Log In

Trip
Liberating the literature

SEARCH PICO ADVANCED PRO RECENT PRO

cesarean section Vaginal Birth after Cesarean Uterine Rupture

624 results for **cesarean section Vaginal Birth after Cesarean Uterine Rupture** by quality ▾

Alerts ✉ Export ▾ Snippets 🔍

Trip has 7 answers for related questions: Show

What is this? Feedback

1. Concomitant Vesicouterine Rupture with Avulsion of Ureter: A Rare Complication of Vaginal Birth after Cesarean Section

Concomitant Vesicouterine **Rupture** with Avulsion of Ureter: A Rare Complication of **Vaginal Birth after Cesarean Section** 27134952 2016 05 02 2018 11 13 2249-782X 10 3 2016 Mar Journal of clinical and diagnostic research : JCDR J Clin Diagn Res Concomitant Vesicouterine **Rupture** with Avulsion of Ureter: A Rare Complication of **Vaginal Birth after Cesarean Section**. QD07-8 10.7860/JCDR/2016/17406.7503 **Uterine rupture** is the most serious and life threatening complication and occurs in 0.7-0.9 (...) % of **vaginal birth after** lower segment **caesarean section**. Cases of bladder **rupture** along with **uterine rupture** have been rarely reported and avulsion of ureter, required ureteric Journal of clinical and diagnostic research : JCDR 2016 Full Text: Link to full Text with Trip Pro PRO

Tweet this Star this Report broken link

Primary Research

2. Prediction of vaginal birth after cesarean delivery in Chinese parturients

Prediction of **vaginal birth after cesarean delivery** in Chinese parturients Prediction of **vaginal birth after cesarean delivery** in Chinese

Evidence type Clinical Area PRO

Become a PRO

If you had Trip Pro you'd have access to 20 further Systematic Reviews, links to 88 free full-text articles and 106 clinical trials — all without adverts.

[Get Trip Pro now >](#)

All Secondary Evidence

Systematic Reviews 16 +20

Evidence-based Synopses 3

Guidelines

Aus & NZ 19

Canada 10

UK 20