

Фурункулёз


ОГЛАВЛЕНИЕ

- ✓ Фурункулёз
- ✓ Виды фурункулёза
- ✓ Причины Фурункулёза
- ✓ Возбудитель фурункулёза
- ✓ Диагностика

фурункулёз

ФУРУНКУЛ (латинское *furunculus*), гнойное воспаление волосяного мешочка и связанной с ним сальной железы. Вызывается обычно стафилококком.





ФУРУНКУЛ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ НА ЛЮБОМ УЧАСТКЕ КОЖИ, ГДЕ ИМЕЮТСЯ ВОЛОСЯНЫЕ ФОЛЛИКУЛЫ. НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ — ЛИЦО, КОЖА ШЕИ, ТЫЛА КИСТЕЙ, ПОЯСНИЦЫ. ВНАЧАЛЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЛОТНЫЙ ЯРКО-КРАСНОГО ЦВЕТА ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ ВОЗВЫШАЮЩИЙСЯ НАД УРОВНЕМ КОЖИ НЕБОЛЬШИМ КОНУСОМ. БОЛЬНЫЕ ОТМЕЧАЮТ ЛЕГКИЙ ЗУД, УМЕРЕННЫЕ БОЛИ. ПО МЕРЕ РАЗВИТИЯ ИНФИЛЬТРАТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, НАРАСТАЕТ ГИПЕРЕМИЯ, ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ОТЕК

Виды фурункулеза

Острый

- ▶ Возникает с образованием множественных фурункулов. Основные признаки острого фурункулеза: плотный болезненный бугорок, в центре которого через 3—4 дня образуется гнойная «головка», затем бугорок самопроизвольно вскрывается с выделением гноя. На месте бугорка просматривается стержень фурункула из некротических масс (омертвевших тканей) синюшного цвета, который на 2—3-й сутки отторгается с остатками гноя и крови; недомогание; головная боль; повышенная температура тела.

хронический

- ▶ Протекает с рецидивами, т. е. может возобновляться и продолжаться долгие месяцы, возникает при пониженном иммунитете. Основные признаки хронического фурункулеза: образование болезненного фурункула; общее недомогание; снижение иммунитета.

Причины фурункулеза

В результате повреждений (микротравм) возбудители инфекций способны проникать в кожу и размножаться там. Начинается гнойно-некротический процесс, поражающий волосяную луковицу и все прилегающие к ней ткани. Но основным фактором, в процессе возникновения воспаления, становится снижение местного или общего иммунитета.

Две причины появления Фурункулёза

1-Местная

- ▶ попадание возбудителя во внутреннюю среду организма через микротравмы.

2-Общая

- ▶ сниженный иммунитет, либо общий сбой иммунной системы

Среди причин возникновения МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ следующие:

1. ослабление иммунитета
2. недостаточное количество витаминов
3. перепад температуры или переохлаждение организма
4. неправильное или самостоятельное лечение фурункулов
5. инфекционное заболевание перенесенное ранее
6. нарушения в обмене веществ

Возбудитель Фурункулёза

-золотистый стафилококк. Он довольно-таки распространен, и при попадании на поверхность кожи обычно не вызывает заболеваний. Но, если присутствуют микротравмы, или снижены защитные свойства, стафилококк очень легко внедряется во внутреннюю среду. Пренебрежение правилами личной гигиены и антисанитарные условия увеличивают частоту контактов с золотистым стафилококком

Диагностика фурункулеза

Диагностика фурункулеза обычно не вызывает затруднений, ввиду поверхностного расположения очагов воспаления. Однако при упорном, не поддающемся терапии течении заболевания может потребоваться развернутая диагностика с установлением точных причин фурункулеза. В этом случае проводят бактериальный посев гнойного содержимого фолликулярной пустулы, развернутый анализ крови, иммунодиагностику. При отсутствии результата проводят полное обследование организма, так как причиной фурункулеза в этом случае может быть общее заболевание (диабет, заболевание крови и т.п.)

Острый Фурункулёз



Хронический Фурункулёз



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Медицинская энциклопедия
2. Микробиологический словарь
3. Википедия
4. Справочник Видаль
5. Большая советская энциклопедия

презентация

Хедоян Алина Хачересовна