

ГЛАВА 9. ВЫСШИЕ ФУНКЦИИ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА.

ВЫСШИЕ ФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ – СПОСОБНОСТЬ К МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСОЗНАНИЮ СИГНАЛОВ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, К АБСТРАКТНОМУ МЫШЛЕНИЮ И ЗАПОМИНАНИЮ – В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ СВЯЗАНЫ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ.

ВНД

Определяет поведение и психику человека



Основу составляют кора и подкорковые центры



Сеченов: рефлекторный характер деятельности



Павлов: учение о ВНД

ВНД – условно-рефлекторная деятельность высш. отделов гол. мозга, обеспечивающая совершенное взаимодействие организма с внешней средой, т. е. поведение.



Сегодня: ВНД – наука о мозговых механизмах поведения и психики.

ВРОЖДЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА






СХЕМА ИНСТИНКТА



УСЛОВНО-РЕФЛЕКТОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Торможение в КБП.

Функция КБП – регуляция деятельности нервных центров



НЕЙРОАНАТОМИЯ МОТИВАЦИЙ

ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ – регулируется гуморальными и нервными механизмами. Глюкозочувствительные и глюкозореактивные нейроны обладают мультимодальной чувствительностью

Реакции **АГРЕССИВНО-ОБОРОНИТЕЛЬНОГО** типа регулируется взаимодействием вентромедиальной и латеральной областей гипоталамуса через центральное серое вещество среднего мозга.

БОДРСТВОВАНИЕ-СОН

Бодрствование – задний отдел гипоталамуса.

Сон – передний отдел гипоталамуса

Гипоталамус - низший ур-нь в лимбической системе. Под контролем МИНЛАЛИНЫ


Тормозит пищевое поведение

Симонов: выделение доминирующей потребности

НЕЙРОХИМИЯ МОТИВАЦИЙ



НЕЙРОАТОМИЯ ЭМОЦИЙ



НЕЙРОХИМИЯ ЭМОЦИЙ

Норадренергическая (НА), дофаминергическая (ДА),
серотонинергическая, холинергическая системы,
нейропептиды

Серотонин, НА, ДА

Рост
концентрации
– настроение
поднимается

Истощение
– состояние
депрессии.


Холинергическая
система –
нарушение ведет к
информационному
психозу



ПАМЯТЬ

Памятью называются мысли или элементы прошлого опыта, отложенные в нервной системе в форме, доступной для извлечения.

ПАМЯТЬ



НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ

```
graph TD; A[НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ] --> B[АНТЕРОГРАДНАЯ АМНЕЗИЯ – неспособность к усвоению новой информации.]; A --> C[РЕТРОГРАДНАЯ АМНЕЗИЯ – неспособность извлечь из памяти информацию, накопленную до момента поражения мозга.]; A --> D[ИСТЕРИЧЕСКАЯ АМНЕЗИЯ – полная потеря памяти.];
```

АНТЕРОГРАДНАЯ
АМНЕЗИЯ –
неспособность к
усвоению новой
информации.

РЕТРОГРАДНАЯ
АМНЕЗИЯ –
неспособность
извлечь из памяти
информацию,
накопленную до
момента поражения
мозга.

ИСТЕРИЧЕСКАЯ
АМНЕЗИЯ –
полная потеря
памяти.




СО
Н

Сон – состояние, характеризующееся угнетением сознания и восприятия окружающей действительности. Во сне снижены многие функции организма (в т.ч. мышечный тонус, частота сокращений сердца, интенсивность обмена веществ, дыхание, симпатический тонус и температура тела).

Нарушения сна:

- Храп – сонное апноэ;
- Бруксизм;
- Сногворение;
- Снохождение;
- Энурез;
- Бессонница.

СОН




Регуляция сна



Нарушения сна

- ✓ Храп – сонная апноэ
- ✓ Бруксизм
- ✓ Сногворение
- ✓ Снохождение
- ✓ Энурез
- ✓ Бессонница

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРА ММА



Уровень активации коры обычно определяют путем записи ЭЭГ, который отражает колебания потенциалов мозга, зарегистрированные через черепную коробку посредством электродов.

Обычно типы ЭЭГ, полученные при переходе от бодрствования к бессознательному состоянию или сну, разделяют на альфа-, бета-, тэта-, дельта-, ритмы.

Альфа- ритм характерен для нормального бодрствующего человека в состоянии покоя (8-14 Гц);

Бета- ритм связан с сознательной концентрацией внимания на каком-либо внешнем объекте, характерен для активного бодрствующего состояния (15-50 Гц);

Дельта-ритм характерен для глубокого сна (у детей менее 4 Гц);

Тэта-ритм характерен для нормальных детей (4-8 Гц).

Рис. 9.8. Четыре основных ЭЭГ ритма.

УРОВНИ СОЗНАНИЯ



Сознание, обусловленное активностью миллионов нейронов коры, зависит от степени их возбуждения.

МЕЖПОЛУШАРНАЯ АСИММЕТРИЯ

Мозолистое тело – крупные пучки белого вещества, соединяющие полушария, - участвует в координации деятельности полушарий.

Ведущее полушарие (обычно левое) отвечает за интерпретацию и формирование устной и письменной речи. Другое полушарие («подчиненное») участвует в пространственных построениях и определении временных взаимоотношений, а также содержит центры музыкального и художественного творчества.




Рис. 9.6. Кора головного мозга на поперечном разрезе.
Оба полушария соединены пучками белого вещества, образующими мозолистое тело.

АССОЦИАТИВНЫЕ ОБЛАСТИ КОРЫ



Информацию об их функции можно получить:

- электрическое раздражение;
- изучение нарушений поведения у больных с повреждением ассоциативных зон в результате инсульта или травмы.

Рис. 9.4. Ассоциативные области.



Неокортекс отвечает за переработку и интерпретацию чувствительной информации, и управление сложными мышечными движениями. Состоит из четырех долей, которые делятся на проекционные и ассоциативные области.

Рис. 9.3.
Неокортекс.