



Новый подход в лечении женщин с атрофическим кольпитом

В.А. Товстановская, А.Б. Прилуцкая, А.И.

Прилуцкий, Е.В. Коваль


Национальный медицинский университет имени

А.А. Богомольца, г. Киев



В настоящее время в
симптоматологии
климактерических нарушений
основное место занимает
проблема возрастных
урогенитальных расстройств,
отрицательно влияющих
на качество жизни женщины в
постменопаузе.

Цель исследования



Изучение эффективности лечения
атрофического кольпита лекарственным
препаратом Далмасин

Дизайн исследования

Обследованы 52 пациентки с атрофическим кольпитом

1 группа – 22 женщины, которым проводилось местное интравагинальное лечение по общепринятой методике с применением эстрогенсодержащего препарата - овестин

2 группа – 30 женщин, которым проводилось местное интравагинальное лечение препаратом **«Далмасин»**.

```
graph TD; A[Улучшение микроциркуляции в органах малого таза] <--> B[Ректальное применение препарата «Далмаксин»]; B <--> C[Стабилизация мембраны гепатоцитов]; B <--> D[Анаболическое действие – ускоряет репаративные процессы]; B <--> E[Системный противовоспалительный эффект];
```

Улучшение микроциркуляции в органах малого таза


Системный противовоспалительный эффект

Ректальное применение препарата «Далмаксин»


Стабилизация мембраны гепатоцитов

Анаболическое действие – ускоряет репаративные процессы

Общая картина жалоб перед началом лечения



Сравнение исчезновения жалоб у пациенток обеих групп



При исследовании препарата «Далмаксин» ,выявлено



Высокий клинический эффект

Хорошая переносимость

Отсутствие побочных эффектов от препарата

ВЫВОДЫ

1. На основании проведенного исследования **установлена высокая терапевтическая эффективность препарата Далмаксин** при атрофическом кольпите и сокращение продолжительности лечения в сравнении с эстрогенсодержащими препаратами для местного применения.
2. **Далмаксин можно успешно применять у женщин менопаузального возраста**, в частности имеющих противопоказания к назначению синтетических эстрогенсодержащих препаратов.
3. Благодаря противовоспалительному, антигипоксантному и регенеративному эффектам, применение препарата **Далмаксин при атрофическом кольпите способствует быстрому купированию симптомов заболевания, предотвращает осложнения в виде склерозирования стенок влагалища и значительно улучшает качество жизни пациенток.**
4. Учитывая все перечисленное выше, можно с