

*Западно -Казахстанский медицинский
Университет имени М.Оспанова*

*Тема: Эффективность
антигомотоксической фармакотерапии в
соответствии с принципами доказательный
медициной*



*Изготовила: резидент-эндокринолог
Ескайырова Н.С*

Цель:

Эффективность формуляра:

- Определение препаратов выбора в соответствии с их относительной безопасностью и эффективностью
- Максимальное повышение эффективности фармакотерапии без снижении ее качества, по возможности исключив более дорогие ЛС, не подвергая риску здоровья пациента.

Вопрос:

- *Какой эффект антигомотоксической фармакотерапии в соответствии с принципами доказательной медициной?*

- Р- Пациент (I, II группа)

- I- I-рандомизированная контролируемая группа

- С- II группа-Плацебо

- О- Результат:

Побочный эффект: Заложненность носа.

I-группа 22 больного заложность носа

13 больного значительно легче к концу не
исчезла

II- группа 16 больного нет

4 больных есть

- Т- месяц

- *Задача: Эффективность антигематоксической фармакотерапии в соответствии с принципами доказательной медицины.*

Пациенты (I, II группа);

I-рандомизированная контролируемая группа

II группа-Плацебо

Побочный эффект: Заложность носа.

I-группа 22 больного заложность носа

13 больного значительно легче к концу не исчезла

II- группа 16 больного нет

4 больных есть

Как видно из приведенных в исследовании; у больных получавших изучаемое лечение, по сравнению с группой пациентов, принимавших плацебо, неблагоприятный исход заложность носа наблюдается реже: 37% и 63% соответственно.

● Этические аспекты:

- Пациентам не нанесли вред
- Уважение: информирование о согласии , уязвимая группа
- Право отказаться от участие
- Риск и польза по научном исследованием ознокомлена
- Одобрена КЭ
- Одобрена всеми соавторами

Тема: **Коррекция системы гомеостаза в
лечении ранней стадии острого
панкреатита.**

Подготовила: Ескайырова Н.С
Проверила: Калгабаева.Г.Х.

Актобе 2016г.

- **Цель:** Изучить эффективность использования плазмафереза как комбинированного метода гемокоррекции и детоксикации при острым тяжелом панкреатите.

Вопрос:

- *Какой эффект плазмафереза при острым тяжелым панкреатите?*

- *P-183 пациента*
- *I-стандартная лечебно-диагностическая программа*
- *C-новая лечебно-диагностическая тактика*
- *O- у пациентов с острым тяжелым панкреатитом была отмечена активация внутрисосудистого свертывания крови. В гемостазиограмме было уменьшено время свертывания крови, увеличен протромбиновый индекс и концентрация фибриногена в крови, укорочена активированное парциальное тромбиновое время и одновременно увеличено количество растворимых фибрин-мономерных комплексов. Плазмаферез оказался не только эффективным методом детоксикации, но и методом коррекции системы гомеостаза. Применение плазмафереза способствовало снижению летальности.*
- *T-2006-2009г*

- Благодаря проведенному лечению нам удалось снизить общую летальность при остром тяжелым панкреатите 32,4% в 1 группе (погибло 24 из 74 пациентов) до 18,3% во 11 группе (погибло 20 из 109 пациентов). Полученные в группах различия оказались статистически значимы: $\chi^2=5,59$, $p<0.05$. Свидетельствует об эффективности предполагаемого нами подхода.

Выбор: удобная

- **Дизайн:** Экспериментальное-контролируемые-рандомизированные-простое слепое клиническое исследование

Этические аспекты:

Все пациенты дали добровольное информированное согласие на использование в научных целях данных, полученных в результате их обследования и лечения.

- Пациентам не нанесли вред
- Уважение: информирование о согласии, уязвимая группа
- Право отказаться от участия
- Риск и польза по научному исследованию ознкомлена
- Одобрена КЭ
- Одобрена всеми соавторами

Литература:

- Панкреонекроз И.И Затевахин – М. 2007-224с
- Основные причины летальности при острым панкреатите в стационарах Москвы / А.С. Ермолов – М.2001г-С. 4-14.
- Acute pancreatitis in five European countries: etiology and mortality/L. -2002- Vol 24. P 223-224