

Тема: Эффективность антигомотоксической фармакотерапии в соответствии с принципами доказательный медициной



Изготовила: резидент-эндокринолог Ескайырова Н.С

Цель:

Эффективность формуляра:

- -Определение препаратов выбора в соответствии с их относительной безопасностью и эффективностью
- -Максимальное повышение эффективности фармакотерапии без снижении ее качества, по возможности исключив более дорогие ЛС, не подвергая риску здоровья пациента.

Bonpoc:

 Какой эффект антигомотоксической фармакотерапии в соответствии с принципами доказательный медициной?

- Р-Пациент (I, II группа)
- I- I-рандомизированная контролируемая группа
- С- ІІ группа-Плацебо
- О- Результат:

Побочный эффект: Заложненность носа.

І-группа 22 больного заложность носа

13 больного значительно легче к концу не исчезла

II- группа 16 больного нет 4 больных есть

Т- месяц

Задача: Эффективность антигомотоксической фармакотерапии в соответствии с принципами доказательный медициной.

Пациенты (I, II группа); І-рандомизированная контролируемая группа II группа-Плацебо

Побочный эффект: Заложненность носа.

І-группа 22 больного заложность носа

13 больного значительно легче к концу не исчезла

II- группа 16 больного нет

4 больных есть

Как видно из приведенных в исследовании; у больных получавших изучаемое лечение, по сравнению с группой пациентов, принимавших плацебо, неблагоприятный исход заложность носа наблюдается реже: 37% и 63% соответсвенно.

- Этические аспекты:
- -Пациентам не нанесли вред
- -Уважение: информирование о согласие , уязвимая группа
- -Право отказаться от участие
- Риск и польза по научном исследованием ознокомлена
- -Одобрена КЭ
- -Одобрена всеми соавторами

Тема: Коррекция системы гомеостаза в лечении ранней стадии острого панкреатита.

Подготовила: Ескайырова Н.С Проверила: Калгабаева.Г.Х.

Актобе 2016г.

 Цель: Изучить эффективность использования плазмафереза как комбинированного метода гемокоррекции и детоксикации при острым тяжелом панкреатите.

Вопрос:

Какой эффект плазмафереза при острым тяжелым панкреатите?

- $lue{P}$ -183 пациента
- І-стандартная лечебно-диагностическая программа
- С-новая лечебно-диагностическая тактика
- 0- у пациентов с острым тяжелым панкреатитом была отмечена активация внутрисосудистого свертывания крови. В гемостазиограмме было уменьшено время свертывания крови, увеличен протромбиновый индекс и концентрация фибриногена в крови, укорочена активированное парциальное тромбиновое время и одновременно увеличено количество растворимых фибрин-мономерных комплексов. Плазмаферез оказался не только эффективным методом детоксикации, но и методом коррекции системы гомеостаза. Применение плазмафереза способствовало снижению летальностти.
- **T-2006-2009**г

Благодаря проведенному лечению нам удалось снизить общую летальность при остром тяжелым панкреатите 32,4% в 1 группе (погибло24 из 74 пациентов) до 18,3% во 11 группе (погибло 20 из 109 пациентов). Полученные в группах различия оказалось статистически значимы: x2=5,59, p<0.05. Свидетельствует об эффективности предполагаемого нами подхода.

Выбор: удобная

 Дизайн: Экспериментальное-контролируемыерандомизированные-простое слепое клиническое исследование

Этические аспекты:

Все пациенты дали добровольное информированноесогласие на использование в научных целях данных, полученных в результате их обследования и лечения.

- -Пациентам не нанесли вред
- -Уважение: информирование о согласие, уязвимая группа
- -Право отказаться от участие
- Риск и польза по научном исследованием ознокомлена
- -Одобрена КЭ
- -Одобрена всеми соавторами

Литература:

- Панкреонекроз И.И Затевахин М. 2007-224с
- Основные причины летальности при острым панкреатите в стационарах Москвы / А.С. Ермолов М.2001г-С. 4-14.
- Acute pancreatitis in five European countries: etiology and mortality/L. -2002- Vol 24. P 223-224