

Wi-Fi



- Сеть: votvete-5G
- Пароль: veterinar

Материалы модуля



Фотографировать можно,
но не нужно



МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
флешки

Виды занятий

- Лекции
- Семинар
- Мастер-класс

Оценка тяжести общего состояния

Реанимационные синдромы

Недостаточность
кровообращения
(циркуляторный
шок)

Дыхательная
недостаточность

Церебральная
недостаточность

Почечная
недостаточность

Коагулопатия

Политравма

Печеночная
недостаточность

Острый живот

Анемия...


Тяжесть системных нарушений

- Удовлетворительное
- Средней тяжести

- Тяжелое

- Крайне тяжелое

- Критическое



Не
Легкое
недомогани
е

Нарушена
жизнедеятельнос
ть

Серьезно
нарушена
жизнедеятельнос

Может
скоро
умереть

Удовлетворительное

Системных нарушений нет

- Сознание ясное. Аппетит сохранен
- Локальная патология (в т. ч. хирургическая), не оказывающая системного влияния на организм (например, перелом предплечья)

Средней тяжести

Легкие системные нарушения

- Сознание ясное. Гипорексия
- Дегидратация 1 ст.
- Непродолжительные рвота, диарея
- Признаки СВР (лейкоцитоз, лихорадка до 40,0)

Тяжелое

Выраженные системные нарушения

- Депрессия, анорексия
- Умеренная гипотония, скорректированная инфузией, преренальная олигурия, дегидратация 1-2 ст.
- Многократные рвота, диарея
- Более 4 судорог с потерей сознания в сутки
- Лихорадка 40,1-41,2

Крайне тяжелое

Выраженные системные нарушения, требующие интенсивного лечения

- Ступор
- Олигоанурия, анурия, гипотония, дыхательная недостаточность – компенсированные за счет непрерывного лечения.
- Многодневная анорексия и недостаточное питание
- Выраженные дополнительные потери жидкости с диареей и рвотой.
- ИПС противосудорожных для контроля эпилептического статуса; более 3 приступов в час; 2 и более приступов в сутки, между которыми животное не восстанавливается
- Стойкая гипотермия.
- Лихорадка 41,3-41,8

Критическое

Тяжелые системные нарушения

Могут привести к смерти в течение 24 часов

- Кома
- Декомпенсированные нарушения жизненно важных функций, в том числе не отвечающие на лечение: ОДН, шок
- Некупированные судороги с потерей сознания
- Тяжелая гипо- и гипертермия
- Лихорадка 41,9 и более

Триаж

- Сортировка пациентов по тяжести состояния
- В условиях недостатка ресурсов
- Кому оказать помощь в первую очередь?
- Кто может подождать?
- На кого не нужно тратить ресурсы

Триаж в нашей практике

- Выявить пациента, которому необходимо оказать помощь немедленно
1. Дыхательная недостаточность
 2. Недостаточность кровообращения
 3. Церебральная недостаточность
 4. Болевой синдром
 5. Тревожный клиент

Цели триажа

- Хорошая забота о клиенте
 - Владелец должен быть встречен сотрудником клиники
 - Мы должны убедиться, что владелец спокоен и чувствует себя нормально
 - Мы должны объяснить владельцу, что сейчас происходит
- Хорошая забота о пациенте
 - Мы должны убедиться, что животное может ждать приема врача
 - Нестабильным пациентам необходимо начать оказывать помощь сразу

Процедура триажа

- Оценить ситуацию по 5 пунктам
- Сообщить резюме клиенту и получить его одобрение
- Оказать помощь, если она нужна
- Провести полный первичный прием

1. Дыхательная недостаточность

- Цианоз либо серые слизистые оболочки
- Одышка
- ЧДД более 60 в покое

2. Недостаточность кровообращения

- Бледность слизистых оболочек
- Плохое наполнение пульса
- Средние и крупные собаки:
ЧСС >140 или < 50 ;
- Мелкие собаки ЧСС > 200
- Кошки ЧДД <140 или >200
- Любое продолжающееся кровотечение

3. Церебральная недостаточность

- Генерализованные судороги либо судороги с потерей сознания
- Ступор, кома (легкая депрессия допустима), сумеречное сознание

Уровень сознания

- Ясное сознание
- Депрессия (легкая или выраженная)
- Ступор
- Кома 1 степени
- Кома 2 степени
- Кома 3 степени

4. Болевой синдром

- Беспокойство, вокализация
- Вынужденная поза
- Очевидная причина боли (например, свежий перелом)

5. Тревожный клиент

- Пациента нужно госпитализировать, если не удастся добиться от спокойствия и готовности ждать

Протоколы

- Триажа
- Оценки общего состояния
- Оценки боли
- Оценки уровня сознания