

ОБЩАЯ ОКЕАНОЛОГИЯ

Термохалинная структура вод океана

Термохалинная структура =

Термическая структура + Халинная структура

Синонимы

Гидрологическая структура

Гидрология

Английский

Hydrographic


Hydrologic

Thermohaline

Чем обусловлено географическое распределение температуры воды в Мировом океане?

Горизонтальное распределение температуры

Тепловой баланс на поверхности
Ветровая циркуляция
Конвекция
Апвеллинг



Summer (Jul.-Sep.) temperature [°C] at the surface (one-degree grid)

Горизонтальное распределение температуры


Тепловой баланс на поверхности
Ветровая циркуляция
Конвекция
Апвеллинг

World Ocean Atlas Climatology

Decade 1995 - 2004

Contour Interval=2

100 м




Annual temperature [°C] at 100 m. depth (one-degree grid)

Горизонтальное распределение температуры

Ветровая циркуляция
Конвекция
Апвеллинг

World Ocean Atlas Climatology
Decade 1995 - 2004
Contour Interval=2

200 м



Annual temperature [°C] at 200 m. depth (one-degree grid)

Горизонтальное распределение температуры


Ветровая циркуляция
Циркуляция промежуточных слоев
Конвекция

World Ocean Atlas Climatology

Decade 1995 - 2004

Contour Interval=0.5

500 m



Annual temperature [°C] at 500 m. depth (one-degree grid)

Горизонтальное распределение температуры


World Ocean Atlas Climatology

Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.5

Циркуляция промежуточных слоев

1000 м



Annual temperature [°C] at 1000 m. depth (quarter-degree grid)

Горизонтальное распределение температуры

World Ocean Atlas Climatology


Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.25

Циркуляция промежуточных слоев

Циркуляция глубинных слоев

2000 м



Annual temperature [°C] at 2000 m. depth (quarter-degree grid)

Горизонтальное распределение температуры


World Ocean Atlas Climatology

Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.25

Циркуляция глубинных слоев

3000 м



Annual temperature [°C] at 3000 m. depth (quarter-degree grid)

Горизонтальное распределение температуры


World Ocean Atlas Climatology

Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.25

Циркуляция придонных слоев

4000 м



Annual temperature [°C] at 4000 m. depth (quarter-degree grid)

Горизонтальное распределение температуры


World Ocean Atlas Climatology

Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.25

Циркуляция придонных слоев


5000 м



Annual temperature [°C] at 5000 m. depth (quarter-degree grid)

Вертикальное распределение температуры



Атлантический океан



Вертикальное распределение температуры


Индийский океан

Potential Temperature (°C) for I08I09 95°E (1000:1)




Вертикальное распределение температуры

Термоклин




Баланс вертикальной диффузии и вертикальной адвекции

$$w \frac{\partial b}{\partial z} \approx \kappa \frac{\partial^2 b}{\partial z^2}$$



Вентилируемый термоклин [Pullosky, and Stommel, 1983](#)

Развитие сезонного термоклина




Поток тепла из атмосферы, вертикальная диффузия тепла и процессы перемешивания в ВКС

Вертикальное распределение температуры

Верхний квазиоднородный слой

ВКС

(верхний перемешанный, гомогенный)



Конвективное

перемешивание

термическое (охлаждение);

соленостное (испарение, ледообразование)

Ветро-волновое


перемешивание

обрушение поверхностных волн;


турбулентность ветровых течений;

Инерционные колебания

Толщина ВКС для зимнего периода
с.п.




Толщина ВКС для летнего периода
с.п.





Вертикальное распределение температуры

Промежуточные экстремумы




Слой атлантических вод в Арктике

Теплый промежуточный слой
Арктика




ХПС в Черном море в июле 1992 г.

Холодный промежуточный слой
Черное море





Балтийское море



Вертикальное распределение температуры

Типизация



Районирование Мирового океана по типам вертикального распределения температуры воды (по В.Н. Степанову)

ЭТ – экваториально-тропический; Т – тропический (основной); ВТ – восточнотропический;
Пр – присредиземноморский (Ср – средиземноморский, Кр – красноморский); СБТ – субтропический; АТ – атлантико-тихоокеанский; СБП – субполярный (СБАр – субарктический, СБАН – субантарктический); П – полярный (Ар – арктический, Ан – антарктический).


Формирование термической структуры океана

- **Поверхностные слои** – тепловой баланс поверхности океана, в полярных районах ледовые процессы, поверхностные течения;
- **Промежуточные слои** – вертикальный теплообмен, вертикальная циркуляция вод, распространение более теплых водных масс из районов умеренных широт в полярные районы (промежуточный максимум температуры), зимнее конвективное перемешивание (промежуточный минимум температуры);
- **Глубинные и придонные слои** – распространение водных масс из районов глубокой конвекции (Антарктида и Северная Атлантика);

Чем обусловлено географическое распределение
солёности воды в Мировом океане?

Горизонтальное распределение солёности


Водный баланс на поверхности
Ветровая циркуляция
Конвекция
Апвеллинг



Summer (Jul.-Sep.) salinity at the surface (one-degree grid)

Горизонтальное распределение солености


Водный баланс на поверхности
Ветровая циркуляция
Конвекция
Апвеллинг



Annual salinity at 100 m. depth (one-degree grid)

Горизонтальное распределение солёности


Ветровая циркуляция
Конвекция
Апвеллинг



Annual salinity at 200 m. depth (one-degree grid)

Горизонтальное распределение солёности

Ветровая циркуляция
Циркуляция промежуточных слоев
Конвекция



Annual salinity at 500 m. depth (one-degree grid)

Горизонтальное распределение солёности


World Ocean Atlas Climatology

Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.125

Циркуляция промежуточных слоев

1000 м



Annual salinity at 1000 m. depth (one-degree grid)

Горизонтальное распределение солёности

World Ocean Atlas Climatology


Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.05

Циркуляция промежуточных слоев

Циркуляция глубинных слоев

2000 м



Annual salinity at 2000 m. depth (one-degree grid)

Горизонтальное распределение солёности


World Ocean Atlas Climatology

Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.05

Циркуляция глубинных слоев

3000 м



Annual salinity at 3000 m. depth (one-degree grid)


Горизонтальное распределение солёности

World Ocean Atlas Climatology

Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.05

Циркуляция придонных слоев



Annual salinity at 4000 m. depth (one-degree grid)

Горизонтальное распределение солёности


World Ocean Atlas Climatology

Decadal Average: 1955 - 2012

Contour Interval=0.05

Циркуляция придонных слоев


5000 м



Annual salinity at 5000 m. depth (one-degree grid)



Вертикальное распределение солености

Атлантический океан



Вертикальное распределение солености



Индийский океан



Вертикальное распределение солености

Верхний квазиоднородный слой


Изохалинный слой более консервативен, чем изотермический слой. В весенне-летний период года его толщина может преобладать.



Изотермический


Сезонный галоклин

Происхождение – сезонный ход таяния льдов, стока рек, атмосферных осадков




Черное море

Вертикальное распределение солёности




Постоянный
галоклин

Промежуточный
минимум
солёности



Вертикальное распределение солености

Промежуточные экстремумы





Промежуточный максимум солености

Промежуточный минимум солености

Вертикальное распределение солености

Типизация



Районирование Мирового океана по типам вертикального распределения солености (по В.Н. Степанову)

ЭТ – экваториально-тропический; Бг – бенгальский; Т – тропический (основной); СрТ – срединнотропический; ; ВТ – восточнотропический;

Пр – присредиземноморский (Ср – средиземноморский, Кр – красноморский); СбТ – субтропический; СА – североатлантический;

ЮТ – южнотихоокеанский; СбП – субполярный (СбАр – субарктический, СбАн – субантарктический); П – полярный (Ар – арктический, Ан – антарктический).

Формирование халинной структуры океана

- **Поверхностные слои** – разность испарения и атмосферных осадков, в прибрежных районах речной сток, в полярных районах ледовые процессы, поверхностные течения;
- **Промежуточные слои** – вертикальный солеобмен, вертикальная циркуляция вод, распространение менее соленых водных масс из субполярных районов (промежуточный минимум солености) или более соленых вод из субтропических районов (промежуточный максимум солености);
- **Глубинные и придонные слои** – распространение водных масс из районов глубокой конвекции (Антарктида и Северная Атлантика);