

Применение населением Могилевской области противомикробных лекарственных средств в домашних условиях



Подготовил

1. Шевцова Виктория Васильевна
2. Тихоновская Анастасия Андреевна

Руководител

Кунцевич Сергей Сергеевич – преподаватель УО «Могилевский
государственный медицинский колледж»


Существует проблема устойчивости микроорганизмов к химиотерапевтическим препаратам



**Что же обуславливает
проблему?**




**Необоснованное
применение этих
препаратов в медицине**



Широкое применение антибиотиков в животноводстве и птицеводстве



Низкое качество ряда дженериков






Распространение необоснованного самолечения

В самом ли деле самолечение широко распространено?



**По поводу каких групп заболеваний
применяются дома
противомикробные лекарства?**



Какие группы противомикробных средств наиболее популярны у населения?



**Цель исследования – определить
распространенность самолечения с использованием
противомикробных лекарственных средств у
населения Могилевской области**



Информация собрана путем опроса и анкетирования





83% семей имеют в домашней аптечке противомикробные средства для приема внутрь

Противомикробные лекарственные средства домашних аптек в абсолютных цифрах и процентах

№	Наименование лекарства по МНН	число	%
1	Амоксициллин	125	41,5
2	Тетрациклин	26	8,6
3	Ампициллин	25	8,3
4	Эритромицин	20	6,7
5	Пенициллин и его соли	18	6,0
6	Доксициклин	16	5,3
7	Цефалексин	10	3,3
8	Офлоксацин	9	3,0
9	Цифотаксим	8	2,7
10	Цефазолин	7	2,3
11	Цефтриаксон	5	1,7
12	Ципрофлоксацин	5	1,7
13	Цефтриаксон	5	1,7
14	Другие средства	22	7,3
ИТОГО		301	100

Наиболее часто в домашних аптечках присутствует
Амоксициллин (41,5%)



Удельный вес групп антибиотиков, находящихся в домашних аптечках, в %

