




Одноклеточные
зеленые водоросли




Зеленые водоросли широко распространены в воде, почве, в наземных местообитаниях, на разных географических широтах, во всех морях и на всех континентах земного шара. Они встречаются в водах с различной степенью солености, температуры, кислотности.



Зеленые водоросли входят в состав различных биоценозов, экосистем. Развиваясь иногда в массовом количестве, они выходят на доминирующее положение в биоценозах.


Массовое развитие микроскопических зеленых водорослей нередко вызывает зеленое или красное цветение воды, почвы, снега, скал.



Одноклеточные

ВОЛЬВОКСОВЫЕ:

- 1 - *Scourfieldia cordiformis*;
- 2 - *Nephroselmis olivacea*;
- 3 - *Pyramimonas tetrarhynchys*;
- 4 - *Polytomella agilis*;
- 5 - *Selenochloris quadriloba* (а - вид спереди; б - вид сбоку);
- 6 - *Spermatozopsis exsultans*;
- 7 - *Tetraselmis cordiformis* (а - вид сбоку; б - вид сверху);
- 8 - *Phyllariochloris striata*;
- 9 - *Chloromonas infirma*;
- 10 - *Scherffelia ovata* (а - вид спереди; б - вид сверху);
- 11 - *Collodictyon triciliatum*;
- 12 - *Chloromonas reticulate*;
- 13 - *Polytoma uvella*;
- 14 - *Thorakomonas irregularis*;
- 15 - *Sphenochloris urceolata*;
- 16 - *Lobomonas stellata*;
- 17 - *Diplostauron angulosa*;
- 18 - *Pteromonas angulosa* (а - вид спереди; б - вид сбоку);
- 19 - *Pedinoperopsis gracilis* (а - в оптическом сечении; б - с поверхности).





Apatococcus lobatus

Sphaerollopsis fluviotilis



Хламидомонадовые:


1-2 - *Chlamydomonas proboscigera*, взрослая клетка и копуляция изогамет;

3 - *Ch. annulata* на панцире коловратки;

4 - *Lobomonas stellata*;


5 - *Furcilla bicaudata*;

6 - *Carteria crucifera*.




Представители рода *хламидомонас* - обитатели мелких, хорошо прогреваемых и сильно загрязненных водоемов. Это активные санитары загрязненных вод, вызывающие зеленое цветение. Наряду с автотрофным способом питания их клетки способны всасывать через оболочку растворенные в воде органические вещества, что способствует активизации процессов самоочищения загрязненных вод.





Chlamydomonas



Chlamydomonas



Lobomonas Limnaeticum



Chlamydomonadas dinobryonii


Chlamydomonas




Echinocoleum spp.

Одноклеточные формы кокковых с гладкой оболочкой:

- 1-4 - *Chlorococcum* (1 - взрослая
клетка,
2 - образование зооспор,
3 - зооспора,
4 - молодые клетки,
образовавшиеся из зооспор);
5-7 - *Chlorella* (5 - взрослая клетка, 6
- образование автоспор,
7 - выход автоспор из материнской
клетки);
8-9 - *Oocystis pseudocoronata*,
отдельная клетка и образование
автоспор;
10 - *Selenastrum bibraiatum*;
11 - *Ankistrodesmus acicularis*.





Chlorococcum



Chlorogonium spp.

Протококковые водоросли исключительно многообразны. В водоемах они принимают активное участие в сложении планктона. Они обычны также в наземных местообитаниях и в почве. Известны среди них симбионты и даже паразиты. Обычно поселяются на панцирях циклопов и дафний, реже - на их личинках, коловратках, инфузориях, личинках комаров.

Некоторые виды специально изучаются для использования в качестве регенераторов воздуха, воды и пищевой биомассы при дальних космических полетах.


A microscopic view of a dense population of Chlorella cells. The cells are small, spherical, and appear as numerous green and blue-green dots scattered across a light blue background. Some cells show a distinct internal structure with a darker green center and a lighter outer layer.


Chlorella

Хлорелла нетребовательна к условиям обитания и способна весьма интенсивно размножаться, поэтому встречается повсеместно. Она входит в состав лишайников. По количеству посвященных ей работ хлорелле принадлежит первое место среди всех водорослей нашей планеты. Она стала основным объектом массового культивирования водорослей для практического использования.

Одноклеточные формы хлорококковых с шипами и выростами на оболочке:

- 1 - *Treubaria triappendiculata*;
- 2 - *Lagerheimia citriformis*;
- 3 - *Diacanthos belenophorus*;
- 4 - *Tetraedron caudatum*;
- 5 - *Golenkinia radiate*;
- 6 - *Polyedriopsys spinulosa*;
- 7 - *Characium acuminatum*.





Tetraedron caudatum

Ankyra





Schrodedia setigera