

A photograph showing three polar bears on a large, reddish-brown ice floe. One bear is standing on the left, looking towards the camera. In the center, another bear is leaning over a large, dark, bloody seal carcass. On the right, a third bear is sitting and eating a piece of the seal. The background shows a blue sea and more ice floes.

**Дикие животные- что это
такое и с чем их едят?**

Грызуны

Могут прогрызть любую мягкую упаковку, включая палатку и рюкзак.


Если поймать то будут кусаться.

Могут забраться в котелок, выбраться не всегда.

Бывали случаи когда их приносили домой в рюкзаке.



Бурундук (род. *Tamias*)
У них есть хвост!!!



Полёвка обыкновенная (*Microtus arvalis*)

Супергрызун

Могут попасть почти куда угодно.

Не живут по одной.


Любят воду.

Переносят 1000 и 1 болезнь.

Распространены повсеместно.

Съедобны но нужно обрабатывать их мясо как заражённое.

Не могут прогрызть только металл.



Серая крыса-(*Rattus norvegicus*)

Лось

- Неагрессивен, кроме самцов в период гона(сентябрь-октябрь)
- Плотный лес-непроходимое препятствие для самца
- Не может долго бежать
- При встрече скорее всего затупит на несколько секунд
- Боится людей и громких звуков



Кабан

- Мелкие кабаны боятся людей и убегают, секачи наоборот
- Быстро бежит, но не умеет менять направление на бегу
- Секачи мало чего и кого



Условно безопасен



Безусловно опасен

Обыкновенная лисица

- Очень любопытные
- Чаще всего бояться людей
- Могут воровать еду из открытых котелков и непрочных упаковок
- Часто переносят бешенство
- У всех есть блохи





Енотовидная собака

- Часто ворует еду
- Боится людей



Волк (*Canis lupus*)


- Чаще всего не воспринимают человека как добычу
- Стайные
- Нападают только в крайнем случае
- Боятся открытого огня и выстрелов (громких хлоп



Дикие(бездомные) собаки

- Часто Агрессивны
- Нападают стаей
- Есть почти везде вблизи населённых пунктов
- Опаснее волков

Прикрепленная на ухо бирка желтого цвета означает, что собака стерилизована, привита и находится под контролем
Но это не означает что она абсолютно безопасна.



Бурый Медведь


- Не воспринимает человека как добычу
- Вскрывает любые человеческие упаковки
- Зачастую прикормлены и не боятся человека
- Боятся открытого огня
- На громкие звуки и выстрелы реагируют по-разному
- Чужие смотрят ситуацию





Гималайский Медведь

- Редко спускается с деревьев
- Неагрессивный
- В красной книге
- Встречается на дальнем востоке



Белый Медведь

- Воспринимает всё что движется как добычу
- Агрессивный(не он такой а жизнь за полярным кругом такая)
- Почти ничего не боится, относиться к огню с любопытством
- В красной книге



Средства Борьбы с крупными хищниками

- Не работает



Зачастую работают



Точно работают



Рысь

- Воспринимает человека как добычу
- Не нападает если не может сразу вцепиться в шею
- Не нападает если крупных зверей больше одного
- Нападает прыгая с деревьев



Бешенство

Инфекционное заболевание вызываемое вирусом бешенства, смертельно опасно, после проявления симптомов у человека летальность близка к 100 процентам

Инкубационный период у человека от 20 дней до двух месяцев, изредка до года. Бешенство могут переносить все млекопитающие, у большинства инкубационный период около двух недель. В конце инкубационного периода животное уже может быть заразно.



Симптомы бешенства у людей

- *Продромальный (ранний период).*

Длится 1 — 3 дня. Сопровождается повышением температуры до 37,2 — 37,3 °С, угнетённым состоянием, плохим сном, бессонницей, беспокойством больного. Ощущается боль в месте укуса.

- *Стадия разгара (агрессия).*

Длится 1 — 4 дня. Выражается в резко повышенной чувствительности к малейшим раздражениям органов чувств: яркий свет, различные звуки, шум вызывает судороги мышц конечностей. Появляются водобоязнь, галлюцинации, бред, чувство страха. Больные становятся агрессивными, буйными, повышается слюноотделение.

- *Период параличей (мнимого улучшения).*

Наступает паралич глазных мышц, нижних конечностей, а также скуловых мышц (отвисшая челюсть.)

Начинает проявляться извращённый аппетит (несъедобное, опасное в желудке)

Состояния как личности уже не существует.

Паралич дыхательных мышц вызывает смерть (удушье).

Порядок действия при укусе потенциально бешеного животного

1. Устранить источник опасности (животное которое вас укусило)
2. Как можно скорее промыть рану, по возможности антисептиком (хлордиоксидин, мироместин, фурацилин), и остановить кровотечение, края раны обработать спиртом или зелёной
3. Обратиться в любой ближайший травмпункт, там всегда можно получить иммуноглобулин и вакцину от бешенства.



По возможности следует **избегать** наложения швов на раны. Наложение швов показано исключительно в следующих случаях:

- при обширных ранах - нескольких наводящих кожных швов после предварительной обработки раны;
- по косметическим показаниям (наложение кожных швов на раны лица);
- прошивание кровоточащих сосудов в целях остановки наружного кровотечения.

Приготовление сомнительного мяса

Все млекопитающие и птицы съедобны без исключения, но в связи с большим количеством переносимых болезней требуется термическая обработка согласно «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» (утв. Минсельхозом СССР 27.12.1983)» (да до сих пор действует)

11.3.1. Мясо и мясопродукты обеззараживают проваркой кусками массой не более 2 кг, толщиной до 8 см в открытых котлах в **течение 3 ч**, в закрытых котлах при избыточном давлении пара 0,5 МПа в течение 2,5 ч. Мясо считается обеззараженным, если внутри куска температура достигла не ниже 80 °С; цвет свинины на разрезе становится бело-серым, а мясо других видов животных серым, без признаков кровянистого оттенка; сок, стекающий с поверхности разреза куска вареного мяса, бесцветный

НЕ змея

Веретеница

- Не является змеёй-безногая ящерица
- Не ядовита, не кусается и клыков нет
- В красной книге
- Не обижайте ящерок пожалуйста



Веретеница ломкая (*Anguis fragilis*)

Змеи

Уж обыкновенный

- Не ядовит.
- Безобиден
- Дурно пахнет
- От укуса может развиться парадонтоз... у



Обыкновенная медянка

- Не ядовита
- Родственник ужа



Полозы

- Не ядовиты
- Безобидны



Полоз обыкновенный



Узорчатый полоз



Палласов полоз

Гадюка обыкновенная (*Vipera berus*)

- Ядовита
- Кусает только в целях самозащиты
- Любит греться на солнце
- Отрубленная голова живёт ещё несколько часов и может укусить
- Для взрослого человека укус в конечность представляет опасность только в случае развития анафилактического шока.
- Опасность представляют укусы в шею и голову, а так же для маленьких детей



Гадюка Никольского, или лесостепная гадюка (*Vipera nikolskii* Vedmederja)

Так же ядовита.
Абсолютно чёрная
По непонятной причине в
красной книге
Сыворотка
взаимозаменяема с



Гюрза (*Vipera lebetina*)

- Немного ядовитее чем обыкновенная
- Сыворотка не взаимозаменяема
- Самая опасная из гадюк



Первая помощь при укусах ядовитых

Змей

- Убрать змею
- Попытаться выдавить яд
- Как можно быстрее промыть рану большим количеством кипяченой воды или антисептиком
- В любом случае дать таблетку антигистаминного средства
- Приготовить шприцы с Адреналином и антигистаминным (димедрол, супрастин)
- Существует специализированные сыворотки-антидоты



Спасибо за внимание!



Это ёж обыкновенный



А это необыкновенный
(ушастый)