



Пастереллез кроликов















KANINCHEN

**CUNIVAK
PAST**

Kombinationsimpfstoff gegen Ansteckenden Kaninchenschupfen und Pasteurellose
inaktiviert, wässrige Suspension, für Kaninchen,
zur subkutanen Injektion

IDT

50 ID

KANINCHEN

**CUNIVAK
PAST**

Kombinationsimpfstoff gegen den Ansteckenden Kaninchenschupfen und die Pasteurellose
inaktiviert, wässrige Suspension, für Kaninchen,
zur subkutanen Injektion

50 ID

VAKZINE

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Wartezeit: Null Tage.
Außer Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.
Nach dem Anbruch sofort zu verbrauchen.
Vor Licht geschützt, bei +2 °C bis +8 °C lagern.
Nicht einfrieren.
Nicht verwendeter Impfstoff oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.
Nur für Tiere.
Verschreibungspflichtig
Zul.-Nr.: 4a/36

IDT Biologika GmbH
Am Pharmazentrum...



Раббивакс

Вакцина инактивированная
пастереллеза кроликов

Объем 10 см³

Для ветеринарного
применения



10 доз



PESTORIN MORMYX
 vaccine against Rabbit haemorrhagic disease and Myxomatosis


10 doses For

1 ml regardless of animal size. Adm

Composition (1 ml): Freeze-dried myxomatosae attenuatum min. 10^{10} pro lyophilisatione, Nutrimentum M

Rabbits should not be slaughtered if vaccination due to a possible local rea

bioveta
 Bioveta, a. s., Czech



PESTORIN MORMYX ly
 fo

Vaccine against Rabbit haemorrhagic disease and Myxomatosis

10 dose

For animal treatment only.

bioveta Bioveta, a. s.
 Czech Republic

Composition (1 ml)
 Haemorrhagic co
 Callicivirus septio
 organorum) – mi
 chloridi solutio
 *Titre of hemaggl
 vaccination of lab
Route(s) of admi
Administration: s
 Withdrawal perio
 meat for 7 days a
 reaction.