


ОБЩАЯ И ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ



Психопатология

Психопатология — раздел психиатрии и клинической психологии, занимающийся изучением расстройств психики с точки зрения медицины и психологии.



Общая психопатология

Общая психопатология – раздел психиатрии, который изучает общие закономерности психического расстройства, типовые психопатологические процессы, природу этих типовых психопатологических процессов (симптомов и синдромов).

Выделение и квалификация симптомов представляет собой начальный уровень психиатрической диагностики.



ЧАСТНАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ

Частная психопатология — изучает отдельные психические заболевания, их этиологию, патогенез, клинику, закономерности развития, способы лечения и восстановления трудоспособности.



МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ,

1.Этап диагностика — чувственное познание феномена болезни.

Задачи — выявление, выделение и подробное описание разнообразных признаков расстройства, в том числе психического.

2.Этап обобщение клинической информации — клинический анализ.

Задачи — группировать выявленные признаки терминологически, т. е. обозначить их как симптомы, что является предметом семиотики, и систематизировать, объединив симптомы в синдромы, представляющие собой объект синдромологии.

3.Этап формирование идеального представления о болезни конкретного человека — диагностическое заключение о нозологической форме.


Задача — построение клинико-динамической модели болезни конкретного больного с формированием представления об особенностях динамики синдромов (синдромогенезе и синдромокинезе), а также о закономерностях взаимосвязи и сменяемости различных синдромальных образований — синдромотаксисе, что на данном этапе должно быть объединено со всей имеющейся в распоряжении врача информацией.

ЛЕЧЕНИЕ

- Специалист после диагностики определяет пусковые механизмы, которые приводят к психопатическому расстройству личности. Лечение начинается с их коррекции, больным назначаются медикаменты и психотерапевтические сеансы. Врач подбирает лекарство с учетом состояния больного, обязательно применение витаминов, иммунных и седативных препаратов.
- Лекарства необходимы для поддержания организма в период обострения психопатии. Также используются группы медикаментов, воздействующих непосредственно на свойства психики. Если у больного наблюдается состояние аффекта, достаточно часто, ему назначают нейролептики. При постоянном возбуждении нервной системы и нестабильности эмоционального фона пациенты принимают транквилизаторы. Антидепрессанты показаны личностям, у которых преобладает сниженное настроение, есть склонность к суициду.

ЛЕЧЕНИЕ

- Психотерапевтические сеансы предусматривают использование когнитивно-поведенческой терапии или рационального подхода. Пациент должен осознать, какие шаблоны его поведения являются социально приемлемыми, что помогает достичь гармонии личности. Возможны групповые и индивидуальные консультации не только для пациента, но и для его близких. Занятия в таких группах преследуют единственную цель—обучить участников эффективному взаимодействию



ПРОФИЛАКТИКА

- Своевременная и правильная диагностика и последующее излечение различного рода соматических и инфекционных заболеваний организма, способных воздействовать на психическое здоровье человека.
- Меры, направленные на предотвращение травматизма
- Меры, направленные на предотвращение химического отравления организма (исключение токсикомании, наркомании и иных зависимостей). Регулярное общение с близкими людьми. Только так можно заметить наметившиеся отклонения и расстройства на начальной стадии.
- Избегание конфликтных и стрессовых ситуаций.
- Фармакологическая борьба со стрессом и переживаниями(имеется в виду употребление при необходимости щадящих успокоительных средств).
- Поддержание здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, формирование новых интересов, увлечений, хобби.
- Регулярный сон.



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ДИАГНОЗЫ

1. Шизофрения и маниакально-депрессивный психоз
2. Эпилепсия и органические поражения ЦНС
3. Психопатии
4. Неврозы
5. Дименции



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

