

МЕТОД РАЗМЕРНОСТЕЙ

Проверил: руководитель курса Манида Сергей Николаевич
Выполнила: слушатель дополнительной образовательной программы «Методика и технологии подготовки обучающихся к участию во всероссийских олимпиадах по математике, физике и астрономии» ФГБОУВО СПбГУ
Кергина Надежда Константиновна
2019 г

Содержание

- Физическая величина
- Размерность физических величин
- Решение задач методом размерностей
- Источники

Физическая величина

- Единица физической величины называется условно выбранная физическая величина, имеющая тот же физический смысл, что и рассматриваемая.
- Физические величины делят на
 - Размерные и безразмерные;
 - Основные и производные.

Размерность физической величины

- Выражение которое характеризует связь данной величины с основными величинами в системе единиц [кг/м³]
- Система единиц – называется совокупность единиц физических величин относящихся к некоторой системе величин и образовавшейся в соответствии с принятыми правилами. (СГС, СИ)

Метод размерностей

- Метод размерностей является наиболее эффективным методом анализа физических ситуаций.
- Достоинства метода:
 1. быстрая оценка масштабов исследуемых явлений;
 2. получение качественных и функциональных зависимостей;
 3. осуществление проверки правильности решения задач;
 4. выполнение некоторых заданий ЕГЭ.

Решение задач

Пример 1. На горизонтальной равнине установлена пушка, стреляющая под углом α к горизонту. Во сколько раз надо увеличить начальную скорость снаряда, чтобы:

- а) дальность полета снаряда увеличилась вдвое;
- б) максимальная высота подъема снаряда увеличилась вдвое;
- в) время полета снаряда увеличилось вдвое?

Размерность некоторой физической величины обычно обозначают прямыми скобками: $[A]$ — размерность величины A .

Возвращаясь к задаче, введем обозначения: t — время полета, h — высота подъема, l — дальность полета. Очевидно, что

$$[t] = T, \quad [h] = [l] = L.$$

Как эти величины зависят от начальной скорости v ($[v] = LT^{-1}$) и ускорения свободного падения g ($[g] = LT^{-2}$)?

Построить из v и g величины с размерностью T и L можно единственным (с точностью до произвольного числового множителя) образом:

$$[v/g] = T, \tag{1}$$

$$[v^2/g] = L. \tag{2}$$

Следовательно, $t \sim v/g$, а $l \sim h \sim v^2/g$. Таким образом, для увеличения высоты и дальности в два раза надо увеличить начальную скорость в $\sqrt{2}$ раз, для увеличения времени полета в два раза надо увеличить начальную скорость в два раза.

• Задачи

1. За какое время, двигаясь равнозамедленно с ускорением a , тело уменьшает свою скорость вдвое по сравнению с начальной скоростью? Какой путь проходит тело за это время?
2. Под каким углом к горизонту охотник должен направить ствол ружья, чтобы попасть в птицу, сидящую на высоте H на дереве, находящемся на L от охотника? В момент выстрела птица начинает падать свободно на землю.

В классической физике все процессы можно описать с помощью трех основных единиц (масса, длина, время), либо их комбинаций.

- Рассмотрим другое применение метода размерности. Если в ответах к заданиям встречаются одни и те же физические величины в различных выражениях, расположенные произвольно, то ответ можно выбрать путем проверки единиц измерений. Приведем подобный пример.
- 1. Электрон с зарядом влетел в магнитное поле со скоростью перпендикулярно линиям индукции магнитного поля и стал двигаться по окружности радиуса R . Какое выражение соответствует модулю вектора магнитной индукции магнитного поля?
- А) $\frac{mve}{R}$ Б) $\frac{mvR}{e}$ В) $\frac{mv}{eR}$ Г) $\frac{eR}{mv}$
- А) - не подходит;
- Б) - не подходит;
- В) .
- Ответ: В

- Шарик массой m , подвешенный на нити, длиной l , вращается по окружности радиусом r , в горизонтальной плоскости с угловой скоростью ω . Какова сила натяжения нити?




Рисунок . Схема движения маятника

- А) $mg \cos \frac{a}{2}$

- Б) $\frac{mgr}{l}$

- В) $m(\omega^4 r^2 + g^2)^{1/2}$

- Г) $m\omega r \sin \frac{a}{2}$

- Анализ условия: ответ Г – быть не может, т.к. $m\omega r = mv$, а не сила. По единицам измерения ответы А и Б возможны, остальные – не по силе натяжения нити:

$$m\vec{a} = \vec{T} + \overline{mg}$$

- Из заштрихованного треугольника видно, что

- Ответ: В).

Редукция размерных констант

Идея метода редукции состоит в том, что некоторые размерные параметры конкретной задачи можно положить равными единице. Для этого необходимо, чтобы размерности этих параметров были линейно независимыми. Такая процедура приводит к существенному упрощению уравнений и позволяет или решить их в общем виде, или проанализировать характер решения.

- Пример 2. Определить закон движения тела массой m , подвешенного на пружине жесткостью k в поле тяжести с ускорением свободного падения g .

Уравнение движения этого тела

$$ma = -kx + mg. \quad (3)$$

В этом уравнении исходно присутствуют три параметра: m , k , g .

Введем новые переменные $x = q\hat{x}$, $t = \tau\hat{t}$, где q и τ — некоторые константы. При этом изменится и ускорение: $a = q\tau^{-2}\hat{a}$. В новых переменных уравнение движения (3) имеет вид

$$mq\tau^{-2}\hat{a} = -kq\hat{x} + mg. \quad (4)$$

Теперь выберем значения констант: $q = mg/k$, $\tau = \sqrt{m/k}$ и перепишем уравнение движения (4):

$$\hat{a} = -\hat{x} + 1. \quad (5)$$

В уравнении (5) не осталось параметров. Более того, сдвигом $\hat{x} \rightarrow \hat{x} + 1$ приводим (5) к уравнению вида

$$\hat{a} = -\hat{x}.$$

Таким образом, характер движения тела в рассмотренном примере не зависит от параметров задачи и описывается уравнением гармонических колебаний.

- Задача

3. Стальной кубик вкатывается с начальной скоростью на ледяную прямолинейную горку, наклоненную к горизонту под углом α . Коэффициент трения скольжения кубика о лед μ . Через какой промежуток времени кубик вернется к основанию горки? На какую максимальную высоту он поднимется?

Источники

1. С.Н.Манида, Физика. Решение задач повышенной сложности. СПб, 2004
2. Пособия, авторы М.В.Комарова и С.Н.Манида. (Механика)
3. <https://urok.1sept.ru/статьи/576015/>
4. Г.Н. Степанова Сборник задач по физике для 10-11 кл., 2014г.