

Оңтүстік Қазақстан Медицина Академиясы

Амангелді Ақерке Уалиханқызы.
Магистрант.

ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРЫНЫҢ СІЛЕКЕЙІНДЕГІ,
ЛИПИДТЕРДІҢ, АСҚЫН ТОТЫҚ ӨНІМДЕРІНІҢ, АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ ГИГИЕНАЛЫҚ
ЖАҒДАЙЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЖАҒДАЙЫ.

БАЯНДАМ




А

Ғылыми жетекші:
м.ғ.д., профессор: Орманов Н.Ж

Кіріспе:

- Қоршаған ортаның экологиялық жағдайының асқынуына байланысты балалардың тіс жегі таралуы мен қарқындылығы, оның асқынулары өршуі орын алуда [Ушаков И.Б. и др., 2006, Супиев Т.К., 2006].
- Шымкент қаласының қоршаған ортаның әртүрлі химиялық заттармен, ластануы антропогенді жағдайға алып келеді, соның ішінде қорғасын ауаның, топырақтың және өсімдіктердің құрамында оның шекті зиянсыз мөлшері (ШЗМ) бірнеше рет жоғары деңгейде орын алған [Хандиллаева Б.М., 2000].
- Қазақстан Республикасында алдын-алу жмыыстарының әлсіздігіне байланысты балаларта тіс жегінің асқынған зақымдануының, соның ішінде іріңді-қабынған одонтогенді аурулардың өскендігі байқалады. (Супиев Т.К., 2006, Орманов Е.К. 2010).



Жұмыстың мақсаты:

- Шымкент қаласының мектеп жасына дейінгі балаларының, сілекейіндегі липидтердің асқын тотық өнімдерінің, ауыз қуысының гигиеналық жағдайына байланысты жағдайын зерттеу.



Зерттеу әдістері мен материалдары:

- Зерттеудің мақсатына байланысты мектеп жасындағы балалардың сілекейінде липидтердің асқын тотығының алғашқы, орта және соңғы өнімдерінің көрсеткішін стандартты спектофотометриялық әдіспен анықтадық. Диенді қоспаның , липидтердің гидроасқын тотығы және малонды диальдегидтің қоюлануын потикалық тығыздық бірлігінде жене нмоль/ мл есептелінді. Зерттеуге мектепке дейінгі балалардың сілекейі стандартты әдіспен алынды, ауыз қуысының гигиеналық қарқындылығының Грин-Вермиллион және Ю.А. Федоров-В.В.Володкина индексі бойынша алынды.

Индекс гигиены полости рта J.C.Green, J.R.Vermillion

$$\text{ИГР-У} = \frac{\text{Сумма значений налета}}{\text{Количество поверхностей}} + \frac{\text{Сумма значений камня}}{\text{Количество поверхностей}}$$

Интерпретация индекса:

0 – 0,6 – низкий индекс; хорошая гигиена
0,7 – 1,6 – средний индекс; удовлетворительная
1,7 – 2,5 – высокий; неудовлетворительная
2,6 – 3,0 – очень высокий; плохая

Индекс Федорова - Володкиной

Формула:
$$\frac{\text{Сумма показателей}}{\text{Количество исследуемых зубов}}$$

Интерпретация индекса:

1,1 – 1,5 – хороший уровень гигиены
1,6 – 2,0 – удовлетворительный
2,1 – 2,5 – неудовлетворительный
2,6 – 3,4 – плохой
3,5 – 5,0 – очень плохой

Зерттеу нәтижелері:

- Шымкент қаласының үш жасқа дейінгі балаларының сілекей құрамындағы липидтердің асқын тотық өнімдерінің алғашқы өнімдерінің бірі – диенді қоспаның мөлшері бақылау тобындағы көрсеткішін шартты 100%-ға тең деп есептегенде, бірінші және екінші гигиеналық (ауыз қуысының гигиеналық қарқындылығының Грин-Вермиллион және Ю.А.Федоров-В.В.Володкина индексі бойынша анықтағанда) топтарда бақылау тобының көрсеткішімен салыстырғанда 14% және 24%-ға жоғарылайды. Ауыз қуысының гигиеналық қарқындылығы бойынша үшінші, төртінші және бесінші топтарды құрайтын мектеп жасына дейінгі балалардың сілекей құрамындағы диенді конъюгаттың қоюлануы бақылау тобының көрсеткішінің 133%, 143% және 157%-ын құрайды.

- Сілекей құрамындағы липидтердің асқын тотық өнімдерінің ортаңғы өнімдерінің бірі – липидтердің гидроасқын тотығы (ЛГАТ) бақылау тобындағы көрсеткішін шартты 100%-ға тең деп есептегенде, бірінші және екінші гигиеналық топтарда бақылау тобының көрсеткішімен салыстырғанда 12% және 26%-ға жоғарылайды. Ауыз қуысының гигиеналық қарқындылығы бойынша үшінші, төртінші және бесінші топтарды құрайтын мектеп жасына дейінгі балалардың сілекей құрамындағы диенді конъюгаттың қоюлануы бақылау тобының көрсеткішімен салыстырғанда 33%, 43% және 57%-ға өседі.

- Липидтердің асқын тотық өнімдерінің соңғы өнімдерінің бірі- малонды диальдегидтің (МДА) сілекей құрамындағы қоюлануы бақылау тобындағы көрсеткішін шартты 100%-ға тең деп есептегенде үш жасқа дейінгі балаларда , соның ішінде бірінші және екінші гигиеналық топтарда бақылау тобының көрсеткішімен салыстырғанда 10% және 15%-ға жоғарылайды. Ауыз қуысының гигиеналық қарқындылығы бойынша үшінші, төртінші және бесінші топтарды құрайтын мектеп жасына дейінгі балалардың сілекей құрамындағы малонды диальдегидтің мөлшері бақылау тобының көрсеткішімен салыстырғанда бақылау тобының көрсеткішінің 122%, 126% және 134%-ын құрайды.

-

Кесте 1– Шымкент қаласының балаларының сілекей липидтердің асқын тотық өнімдерінің ауыз қуысының гигиениялық жағдайына байланысты жағдайы:

Көрсеткіштер		ДҚ (отб/мл)	ЛГАТ (отб/мл) %	МДА (нмоль/мл)
1-ші топ (3 жасқа дейін)	Бт	0,21±0,01	1,9±0,09	36,6±1,6
	1	0,24±0,01*	2,2±0,08*	40,5±1,5*
	2	0,26±0,01*	2,4±0,11*	42,1±2,1*
	3	0,28±0,01*	2,6±0,12*	44,5±2,2*
	4	0,30±0,02*	2,8±0,13*	46,3±2,3*
	5	0,33±0,02*	3,1±0,14*	49,2±2,4*
	Жк	0,28±0,02	2,62±0,17	44,5±2,3
2-ші топ (6 жасқа дейін)	Бт	0,22±1,6	2,0±0,10	37,6±1,6
	1	0,25±0,01*	2,4±0,10*	48,4±2,1*
	2	0,26±0,01*	2,5±0,11*	51,2±2,3*
	3	0,28±0,02*	2,7±0,12*	53,4±2,3*
	4	0,31±0,02*	2,9±0,13*	55,4±2,4*
	5	0,34±0,02*	3,1±0,15*	56,4±2,6*
	ЖК	0,29±0,02*	3,12±0,01*	52,97±2,6*

Ескерту:

1, 2, 3, 4 және 5 топтар – ауыз қуысының гигиеналық қарқындылығының Грин-Вермиллион және Ю.А.Федоров-В.В.Володкина индексі бойынша

* - $p < 0,05$ дәлдік көрсеткіш бақылау тобымен салыстырғанда;

Бт –Бак.

- Зерттеуге алынған екінші жастық тобында (6-жасқа дейін) балалардың сілекей құрамындағы диенді қоспаның мөлшері 1-ші және 2-ші гигиеналық топта бақылау тобымен салыстырғанда 13,6%-ға және 18%-ға өсті. Ауыз қуысының гигиеналық қарқындылығы бойынша үшінші, төртінші және бесінші топтарды құрайтын мектеп жасына дейінгі балалардың сілекей құрамындағы диенді конъюгаттың қоюлануы бақылау тобының көрсеткішінің 127%, 141% және 155%-ын құрайды, яғни бақылау тобымен салыстырғанда өсу деңгейі 27%, 41% және 55%-ға тең болды.
- Мектеп жасына дейінгі балалардың ауыз қуысының гигиеналық қарқындылығы бойынша сілекей құрамындағы липидтердің гидроасқын тотығы (ЛГАТ) қоюлануы бірінші және екінші топтарда 20% және 25%-ға, ал үшінші, төртінші және бесінші топтарды құрайтындарда сілекей құрамындағы липидтердің гидроасқын тотығы (ЛГАТ) қоюлануы бақылау тобының көрсеткішінің 135%, 141% және 155%-ын құрайды, яғни бақылау тобымен салыстырғанда өсу деңгейі 35%, 41% және 55%-ға тең болды.

Қорытынды :

- Шымкент қаласының балаларының тісжігінің және ауыз қуысының гигиеналық индексінің дәрежесіне байланысты қандағы липидтердің асқын тотығының өнімдерінің топтасуы бірінші сатысында 13,3%-ға, екінші сатысында 20%-ға, үшінші сатысында 28,7%-ға, төртінші сатысында 38%-ға, бесінші сатысында 78%-ға жоғарылайды.

-
-



**Назарларыңызға
рахмет!!!**