Основные положения риказов №720, 408, 320, 1311, 288, 170, регламентирующих санитарно-

эпидемиологический режим

Выполнила: студентка 309 группы

Кулишова А.А

Приказ № 720

Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией

Приказ № 720

Инструкцию по организации и проведению санитарно-гигиенических мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях (отделениях хирургического профиля, в палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии). Инструкцию по бактериологическому контролю комплекса санитарногигиенических мероприятий в лечебно-профилактических учреждениях (отделениях хирургического профиля, в палатах и отделениях реанимации и интенсивной терапии)

Инструкцию по бактериологическому обследованию на выявление носителей патогенного стафилококка и проведению санации

Инструкцию по очистке (мойке) обеззараживанию аппаратов ингаляционного наркоза и искусственной вентиляции легких

Приказ № 720

Этапы генеральной уборки

Генеральная уборка проводится в оперблоке, стерилизационном отделении, процедурных и смотровых кабинетах.

Генеральная уборка проводится в перечисленных помещениях 1 раз в неделю, в других помещениях ЛПУ-1 раз в месяц.

- Дезинфекция: отодвинуть мебель и залить один из дезинфектантов. Экспозиция 1 час. Дезинфектанты растворы хлорамина 5%, перекиси водорода 6% с раствором моющего средства, хлорамина активированного 1%, деохлора 1 таблетка на 7 литров воды.
- Проветривание до полного исчезновения запаха дезинфектанта.
- Отмыв. Стены и пол помещения моются сверху вниз 1-2% мыльно содовым раствором, затем дистилированной водой.
- Упьтрафиолетовое облучение в течение 2 часов с 15 минутным перерывом после часа

О МЕРАХ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В СТРАНЕ

Методические указания "Эпидемиология и профилактика вирусного гепатита A и вирусного гепатита ни A, ни B с фекальнооральным механизмом передачи возбудителя".

Методические указания "Эпидемиология и профилактика вирусных гепатитов В, дельта и ни А, ни В с парентеральным механизмом передачи возбудителя«.

Методические указания "Средства и методы дезинфекции и стерилизации".

Методические указания "Клиника, диагностика, лечение и исходы вирусных гепатитов у взрослых и детей"

С целью снижения заболеваемости вирусными гепатитами проводятся следующие мероприятия:

- L.Постоянное обследование доноров **к**рови.
- 2.Постоянное обследование реципиентов гемопрепаратов.
- 3.Защита и обработка рук медицинского персонала при контакте с кровью.
- 1.Соблюдение режимов предстерилизационной очистки и стерилизации всего медицинского инструментария.

5 Обельповациь персоцала мелипинских упрежлений (группы риска).

Приказ 320 от 05.03.1987 «Организация и проведение мероприятий по борьбе с педикулезом»

320

В приемном отделении все поступающие на лечение пациенты осматриваются средним медицинским персоналом на педикулез. При поражении пациента следует санитарная обработка педикулеза.

С этой целью для обработки волос используется бензилбензоат (2 г анестезина, 20 мл бензилбензоата, 80 г вазелинового масла). Жидкость наносят на волосы, экспозиция 1 час. Также используют карбофос 0,15% водная эмульсия. Экспозиция от 20 минут до 3 часов, после чего волосы промывают 5% раствором уксусной кислоты.

Приказ МЗ СССР № 288 от 23.03.1975 «О санитарно- эпидемическом режиме в лечебно- профилактическом учреждении».

Режим обеззараживания отдельных объектов

Ветошь	Замачивание в 1% растворе хлорамина на 60
	МИН
Кровать больного	Обработка 1% раствором хлорамина
Постельные	Камерная обработка после выписки больного
принадлежности	
Ванна, санузел	Орошается 1% раствором хлорамина, моется
	с применением моющих средств
Судна и горшки	Погружение в 1% раствор хлорамина на 1 час
Наконечник для клизм	Замачивание в 1% растворе хлорамина на 1
	час

Приказ МЗ и МП РФ № 170 от 16.08.1994 «О мерах по совершенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации».

ПРИКАЗ

Каждый вости при вости набором

- Настойка йода 5% 10 мл
- Раствор перманганата калия 0,05% 50 мл
- Раствор перманганата калия 0,01% 50 мл
- Спирт этиловый 70%- 50 мл
- Шприцы 2,0 (для промывания глаз) и 10,0 (для промывания полости носа), всего 2 шт
- Перчатки 2 пары
- Стерильные тампоны
- Пластырь

Меры профилактики при попадании крови и других

биологических жидкостей

в глаза - промыть раствором перманганата калия 0,01%

- в носовые ходы перманганат калия 0,05%
- на слизистую полости рта прополоскать 70% этиловым спиртом или 0,05% раствором калия перманганата
- на кожные покровы обработать 2 минуты 70% этиловым спиртом. Не тереть!
- при проколе перчатки или кожи рук вымыть руки в перчатках под проточной водой с мылом, снять перчатки, выдавить из паны кровь, вымыть руки с мылом, обработать рану 5% настойкой йода. Не тереть!

Рекомендуется прием азидотимидина в течение **30** дней. Рекомендовано начинать прием препарата как можно раньше (через 1 час после контаминации).

Все инциденты фиксируются в <u>журнале аварийных ситуаций</u>. Для решения вопроса о профессиональном заболевании следует исследовать кровь на ВИЧ и повторять исследование в течение 2 лет с интервалом 3 месяца для контроля за

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Приказ 408 M3 СССР от 12.07.1989 г. «О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране».
- Приказ МЗ и МП РФ № 170 от 16.08.1994 «О мерах по соврешенствованию профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации».
- Приказ № 720 от 31.07.1978 «Об улучшении медицинской помощи больным с гнойными хирургическими заболеваниями и усилении мероприятий по борьбе с внутрибольничной инфекцией».
- Приказ МЗ СССР № 288 от 23.03.1975 «О санитарно- эпидемическом режиме в
 лечебно-профилактическом учреждении».
- 5 Приказ 320 от 05 03 1987 «Организация и проведение мероприятий по борьбе

