


Глистные заболевания



Острицы



Аскариды



Ленточные черви - цепни



Симптомы:

- быстро утомляются,
- становятся рассеянными,
- головные боли,
- тошнота,
- рвота,
- может развиваться малокровие.


Пути заражения человеческой аскаридой



Вредные привычки




Грязные руки



Меры профилактики аскарид у детей


- . Среди населения следует проводить активную разъяснительную работу. Родители должны приучать детей, начиная с самых маленьких, пользованию горшками или уборными (если они безопасны для детей), а также к тому, чтобы маленькие дети указывали места загрязнения ими почвы фекалиями, чтобы можно было своевременно провести ее очистку и обезвреживание.



Острицы


- — это паразитические черви, которые вызывают заболевание под названием энтеробиоз. Основными жалобами при поражении этим видом глистов являются зуд в области заднего прохода, особенно в ночное время, когда самки остриц выползают наружу.






Одна особь выделяет до 240 тысяч яиц в сутки.


- Конечным пунктом аскарид является тонкий кишечник, где они развиваются во взрослых особей. Прикрепляясь к стенке кишечника головным концом, на котором есть ротовое отверстие, гельминт всасывает питательные вещества.



Развитие аскариды



Симптомы и признаки глистов у взрослого человека



Строение и развитие Человеческой аскариды



Основные данные по некоторым гельминтам

Информационная таблица www.pervenez.ru

Гельминты	Источник заражения	Основные признаки	В каком возрасте обычно болеют
Аскаридоз	Яйца гельминтов (после их пребывания в земле).	Возможно отсутствие симптомов, снижение массы тела, интоксикация, непроходимость кишечника.	Чаще болеют дети дошкольного и младшего школьного возраста. Заражение легко происходит из-за немытых рук, при употреблении в пищу немытых овощей, фруктов, ягод.
Энтеробиоз	Яйца гельминтов (из окружающей среды, от человека, самозаражение).	Зуд в перианальной области.	Обычно болеют дети в возрасте около 5 лет. Чаще всего источником является другой больной ребенок. Яйца могут попасть в рот с рук, одежды, постельного белья и пр.
Токсокароз	Яйца гельминтов (после их пребывания в земле).	Зависит от локализации (кашель, увеличение печени, снижение остроты зрения). Возможно отсутствие симптомов.	Чаще болеют дети в возрасте до 10 лет, преимущественно в возрасте около 4 лет. Источником заражения могут быть собаки и кошки, а также почва при загрязнении испражнениями животных.
Трихинеллез	Мясо, которое заражено личинками	Диарея, боли в мышцах, лихорадка.	Разный возраст. Цикл трихинелл поддерживают свиньи и другие животные. Заражение возможно при употреблении мяса с плохой обработкой (недоваренное).

**Соблюдайте правила личной
гигиены!!!**