


# Применение производной функции для отыскания точек экстремума




$f(x)$  возрастает:  $x \in (-\infty; -1] \cup [0; +\infty)$

$f(x)$  убывает:  $x \in [-1; 0]$

$$f'(-1) = 0$$

$$f'(0) = 0$$



$f(x)$  возрастает:  $x \in (-\infty; -1] \cup [0; +\infty)$

$f(x)$  убывает:  $x \in [-1; 0]$



касательной в точке  $x = -1$  не существует

касательная в точке  $x = 0$  – ось  $OY$

Точку  $x = x_0$  называют **точкой минимума** функции  $y = f(x)$ , если у этой точки существует окрестность, для всех точек которой выполняется неравенство

$$f(x) \geq f(x_0)$$



$$y(x_0) = y_{min}$$




Точку  $x = x_0$  называют **точкой максимума** функции  $y = f(x)$ , если у этой точки существует окрестность, для всех точек которой выполняется неравенство

$$f(x) \leq f(x_0)$$

$$y(x_0) = y_{max}$$




Точки минимума и максимума функции – **точки экстремума** (от латинского слова *extremum* – «крайний»).




Пьер Ферма  
(1601 – 1665 гг.)



Леонард Эйлер  
(1707 – 1783 гг.)



Колин Маклорен  
(1698 – 1746 гг.)




$$x = x_0, (x_0; f(x_0))$$




$$f'(-1) = 0, f'(0) = 0$$

$f'(-1)$  – не существует,  $f'(0)$  – не существует

**Теорема 4.** Если функция  $y = f(x)$  имеет экстремум в точке  $x = x_0$ , то в этой точке производная функции либо равна нулю либо не существует.



Внутренние точки области определения, в которых производная функции равна нулю, называют **стационарными**, а внутренние точки области определения, в которых производная функции непрерывна, но производная не существует, называют **критическими**.







**Теорема 5.** Пусть функция  $y = f(x)$  непрерывна на промежутке  $X$  и имеет внутри промежутка стационарную или критическую точку  $x = x_0$ . Тогда:

а) если у этой точки существует такая окрестность, в которой при  $x < x_0$  выполняется неравенство  $f'(x) < 0$ , а при  $x > x_0$  – неравенство  $f'(x) > 0$ , то  $x = x_0$  – точка минимума функции  $y = f(x)$ ;

б) если у этой точки существует такая окрестность, в которой при  $x < x_0$  выполняется неравенство  $f'(x) > 0$ , а при  $x > x_0$  – неравенство  $f'(x) < 0$ , то  $x = x_0$  – точка максимума функции  $y = f(x)$ ;

в) если у этой точки существует такая окрестность, что в ней и слева и справа от точки  $x_0$  знаки производной одинаковы, то в точке  $x_0$  экстремума нет.



# Пример:

● Найдите точки экстремума функции  $y = 7 + 12x - x^3$  и определите их характер.

Решение:

$$f'(x) = 12 - 3x^2$$


$$12 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow 3(4 - x^2) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = -2 \text{ или } x = 2$$

$-2$  – точка экстремума

$2$  – точка экстремума

$x = -2$  – точка минимума

$x = 2$  – точка максимума



Ответ:  $x = -2$  – точка минимума,  $x = 2$  – точка максимума

# Алгоритм исследования непрерывной функции $y = f(x)$ на монотонность и экстремумы:

1. Найти производную  $f'(x)$ .
2. Найти стационарные ( $f'(x) = 0$ ) и критические ( $f'(x)$  не существует) точки функции  $y = f(x)$ .
3. Отметить стационарные и критические точки на числовой прямой и определить знаки производной на получившихся промежутках.
4. На основании теорем 1, 2 и 5 сделать выводы о монотонности функции и о ее точках экстремума.


**Замечание!** Если заданная функция имеет вид  $y = \frac{p(x)}{q(x)}$ , то точки, в которых  $q(x) = 0$  тоже отмечают на числовой прямой, причем делают это до определения знаков производной.

# Пример:

Исследовать функцию  $y = \frac{x^4+16}{x^2}$  на монотонность и экстремумы.

Решение:

$$x = 0$$

$$f'(x) = \frac{(x^4 + 16)' \cdot x^2 - (x^4 + 16) \cdot (x^2)'}{(x^2)^2} = \frac{4x^3 \cdot x^2 - 2x(x^4 + 16)}{x^4} =$$
$$= \frac{4x^5 - 2x^5 - 32x}{x^4}$$


$$f'(x) = 0 \text{ при } x = -2, x = 2$$

при  $x \in (-\infty; -2) \cup (0; 2)$  функция убывает, при  $x \in (-2; 0) \cup (2; +\infty)$  функция возрастает

$$x = -2 - \text{точка минимума } y_{min} = \frac{(-2)^4 + 16}{(-2)^2} = 8$$

$$x = 2 - \text{точка минимума } y_{min} = \frac{2^4 + 16}{2^2} = 8$$

# Пример:


Исследовать функцию  $y = 2x^5 + 5x^4 - 10x^3 + 3$  на монотонность и экстремумы.

Решение:

$$f'(x) = 10x^4 + 20x^3 - 30x^2$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 10x^4 + 20x^3 - 30x^2 = 0 \Leftrightarrow 10x^2(x^2 + 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 10x^2 = 0 \text{ или } x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ или } x = -3 \text{ или } x = 1$$



при  $x \in (-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$  функция возрастает,

при  $x \in (-3; 0) \cup (0; 1)$  функция убывает  $\Leftrightarrow$  при  $x \in (-3; 1)$  функция убывает

$$x = -3 - \text{точка максимума } y_{max} = 2(-3)^5 + 5(-3)^4 - 10(-3)^3 + 3 = 192$$

$$x = 1 - \text{точка минимума } y_{min} = 2 \cdot 1^5 + 5 \cdot 1^4 - 10 \cdot 1^3 + 3 = 0$$