


“Астана Медицина Университеті” АҚ

Дисбактери оз

**Орындаған: Бектаева А
Қабылдаған : Жукабаева С.С**

- Дисбактериоз- ол ішектегі микроорганизм құрамының өзгеруі.

Дисбактериоз даму қауіп -қатер факторына жататындар:



Дисбактериозға алып келетін жағдайлар

Ішек моторикасының бұзылуы

Асқазан ішек жолының созылмалы аурулары

Аллергиялық аурулар: атопиялық дерматит, тамағамдық аллерия

Жедел инфекциялық аурулар

Радиацияның әсері т.б.

- Ішектің сапалық және сандық микрофлорасы бұзылған бала мазасыз болады, тамақтандырған соң 1,5-2 сағаттан соң пайда болатын ішектің ауырсыну спазмынан баланың ұйқысы бұзылады. Ол көбінесе іштің желденуімен жүреді. Іштің желденуі және тамақтың ішекке баруының бұзылысынан кекіру және құсу пайда болады. Дисбактериоздың ауыр жағдайыда мальабсорбция синдромы пайда болады, ол дене салмағын аз қосумен сипатталады.


- Дисбактериоздың ауыр жағдайда мальабсорбция синдромы пайда болады, ол дене салмағын аз қосумен сипатталады.



- Ішектегі сіңірілу бұзылғанда диарея, стеаторея, метеоризм , полигиповитаминоз симптомы пайда болады. Токсико-дистрофиялық жағдайда көптеген тамақ өнімдеріне интолеранттық пайда болады. Патологиялық жағдайға гепатобилиарлы жүйе және ұйқы безі қосылып фермет және өтқышқылы дефициті пайда болады. Толық қорытылмаған тамақ өнімдерінің макромолекулалары жиналып, олар аллергендерге айналып, аллеродерматозды шақырады.

Үлкен жастағы балаларда тұрақты іш қатулар, ішектік түйілулер болады. Балалар іштегі аусырсынуға, кекіруге шағымданады. Тәбеті төмендейді. Ұзақ және тұрақты дисбактериозда интоксикациялық және астено-неврологиялық синдром дамиды.

Кейде дисбактериоз ауыр болып, микробтар басқа органдарға таралып қабыну процесі шақырады. Мысалы: саңырауқұлау аурулары (кандидомикоз) ангинаны, АІЖ зақымдануы және өкпеде қабыну процесін тудырады.

The image shows two babies sitting on a light-colored surface. The baby on the left is smiling and looking towards the camera. The baby on the right is crying with its mouth wide open and eyes closed. A semi-transparent white box with black text is overlaid on the left side of the image, partially covering the smiling baby's face.

**Некоторые симптомы
дисбактериоза у детей:**

- беспокойство
- рвота и тошнота
- чередование
поносов и запоров
- срыгивания
- вздутие живота

Нәрестені ерте емізу

Анасы тамақтану
рационын сақтау

1 жылға дейін емізу

Қосымша тамақты
уақытында енгізу

дене салмақ динамикасын,
жалпы жағдайын, және
нәжісін бақылау.

Дисбактерио
3
профилактик
асы

Дисбактериоз диагностикасы

дисбактериоз диагностикасы клиникалық және лабораториялық зерттеулерге негізделген. Нәжісті копрологиялық және бактериологиялық зерттеу жүргізіледі.

дисбактериозды
пайда еткен себепті
жою керек

дұрыс
тамақтандыру
керек.

Дисбактериоз
емі

Жасанды
тамақтанатын
балаларға емдік
қосымша тамақ беру
керек

Сүтті тамақтарды
бермеу керек