

Оказание первой медицинской помощи при обмороке и коллапсе.




Обмороке
и коллапсе

Оказание

Обморок

Обморок — внезапная, кратковременная потеря сознания, вызванное острым нарушением кровообращения в головном мозге, ослаблением деятельности сердечной и дыхательной системой. Это происходит потому, что мозг не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ. Обморок от полной потери сознания отличается тем, что длится в среднем не дольше пяти минут.



Виды обморока.



Мозговой обморок возникает при нарушении церебральной гемодинамики, когда изменяется тонус сосудов головного мозга.

Он наблюдается при эпилепсии и инсульте.

Рефлекторный обморок развивается под действием боли, психоэмоционального напряжения(страх, испуг, нервное потрясение).

В этом случае в результате рефлекторного спазма периферических сосудов резко уменьшается приток крови к сердцу и, следовательно, снижается кровообращение головного мозга.

Симптомы.

Появлению такого нарушения сознания предшествуют дискомфортные и неприятные ощущения: головокружение;

резкое появление слабости
(отсутствие сил);

шум, звон в ушах;

сильная пульсация в висках;

тяжесть в затылке;

снижение остроты зрения мигание
«мушек» потемнение в глазах;

бледность кожи, нередко появление
серого оттенка;

появление тошноты;

спазмы живота предшествуют потере
сознания при месячных;

чрезмерное потоотделение.

После падения : зрачки расширяются;
конечности холодеют;

пульс слабый и частый;

дыхание ускоренное, поверхностное;

АО снижается(80/20 ммрт.ст).

Приступ длится от нескольких секунд
до 1-2 мин не более 4 мин.



ОБМОРОК

ПРИЗНАК ОБМОРОКА
кратковременная потеря сознания
(не более 3-4 минут)
потере сознания предшествует
резкая слабость, головокружение, звон в ушах, потемнение в глазах.

**ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОБМОРОКА НЕОБХОДИМО
ВЫЗВАТЬ ВРАЧА**

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ ОБМОРОКА



1

Убедиться в
наличии пульса
на сонной
артерии



2

Освободить
грудную
клетку от
одежды и
расстегнуть
пояс



3

Приподнять
ноги для
притока
крови
к голове



4

Надавить на
болеуую точку
у перегородки
носа
(10-20 секунд)

ВНИМАНИЕ!

Если нет пульса на сонной
артерии - приступить
к комплексу реанимации

Если пульс есть, но сознание
не появилось в течении 3-4 минут,
повернуть пострадавшего
на живот и приложить
холод к голове

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

При появлении боли в животе и при повторных обмороках -
положить холод на живот

При тепловом ударе - перенести в прохладное место, приложить
холод к голове и груди

При голодном обмороке - напоить сладким чаем

КОМА

ПРИЗНАКИ КОМЫ

- потеря сознания более чем на 4 минуты
- обязательно есть пульс на сонной артерии
- возможна рвота

НЕЛЬЗЯ!

Поддаваться панике

Терять время на выяснения обстоятельств случившегося

СХЕМА ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЯХ КОМЫ

ПОВЕРНУТЬ
Пострадавшего
на живот



1

До прихода врача
пострадавший
должен находиться
в положении
"лежа на животе"

ОЧИСТИТЬ
Ротовую полость



2

Периодически
удалять слюзу
и рвотные массы
салфеткой
или резиновым
баллончиком

ПРИЛОЖИТЬ
Холод к голове



3

Использовать
пузырь со льдом или
бутылку (пакеты)
с холодной водой
(снегом),
гипотермический
пакет

НЕЛЬЗЯ!

ОСТАВЛЯТЬ ЧЕЛОВЕКА В СОСТОЯНИИ КОМЫ
ЛЕЖАТЬ НА СПИНЕ



















