

# Вредители растений.

Насекомые — одна из самых древних, многочисленных и разнообразных групп животных на Земле — более миллиона видов, распространены повсюду и играют огромную роль в биологическом круговороте веществ, образовании почвы и опылении растений. Многие виды насекомых являются вредителями декоративных сельскохозяйственных культур.



## Долгоносик цветоед.

Когда вредит: вредит с того времени, когда проснется от зимней спячки. А просыпается он рано. Выедает еще нераспустившиеся почки, ест молодые листочки, и самое главное - откладывает яйца в бутоны на плодовых деревьях. В скором времени из яиц выводятся гусеницы, которые убивают бутон, не давая ему распуститься.


Как бороться: пользуясь тем, что в холодную погоду жуки не летают – рано утром нужно стрясти долгоносиков на пленку. Но самое главное – нужно опрыскивать деревья по разовому бутону, чтобы уничтожить жуков до откладывания яиц. Обработку проводят Конфидором, Искрой золотой или другими препаратами.



## Короед.

Когда вредит: Появление короедов – тревожный сигнал для садовода. Значит в саду есть неблагополучие. Положение опасно тем, что короеды едят круглый год. И, уезжая осенью, с участка, весной можно застать деревья с отвалившейся корой, или найти под деревом кучки опилок.

Как бороться: По возможности надо вырезать и сжечь поврежденные участки веток. Есть сведения, что эффективны обработки сада Би-58, когда у короедов отраждаются бродяжки ( май). В остальном надо только создавать благоприятные условия для деревьев, проводить санитарную обрезку и делать участок максимально не привлекательным для вредителей.



## Вишневая муха

Когда вредит: Вредить начинает, когда на черешне появляется завязь. Нужно проводить опрыскивание, когда цветет акация.

Как бороться: Для борьбы с вредителем надо проводить опрыскивание Инта-виром, Кинмиксом и другими препаратами. Сложность в том, что до созревания ягод можно провести только одну обработку. Поэтому важно поймать нужный момент и истребить вредителя.



## Стеклянница

Когда вредит: Вредит все время, причем не только смородине и крыжовнику, но и плодовым деревьям.

Как бороться: Обработку проводить до цветения Фуфаном или Карбофосом. Все угнетенные побеги с мелкими листьями вырезают и сжигают. Сухие ветви тоже надо своевременно вырезать. Если нормально дружить с секретом, то от вредителя можно избавиться даже без опрыскиваний.



## Огневка

Когда вредит: Вредит при появлении завязей. Бабочки откладывают яйца к завязям смородины и крыжовника.

Как бороться: Бороться с ними можно с помощью пленки или рубероида, которым застилают землю вокруг кустов. Бабочки не могут выбраться на волю и погибают. Или же опрыскать кусты Фуфаноном после цветения.

## Плодожорка



Когда вредит: Время появления плодожорки заметить нетрудно – яблоки начинают опадать и у них есть червоточина.

Как бороться: Надо опрыскивать сад Конфидором, Зубром, Танрегом, Искрой и другими препаратами.

Спасибо за внимание!