# Детский Аутизм

Силина Елизавета НОД-1931

#### Аутизм: что это такое?



- Аутизм это психическое расстройство, основные симптомы это нарушение социальных взаимодействий и расстройства в эмоциональной сфере.
- Когнитивные способности при аутизме могут быть снижены или сохранены все зависит от формы заболевания, степени его тяжести.

## Аутизм у детей(синдром Каннера)

- Признаки аутизма у грудничка это отсутствие желания идти на руки, отсутствие комплекса оживления при обращении к нему взрослого.
- В возрасте нескольких месяцев здоровый ребенок начинает узнавать родителей, учится различать интонации их речи, при аутизме этого не происходит. Ребенок одинаково равнодушно относится ко всем взрослым и может неправильно воспринимать их настроение.
- Уже в возрасте 1 года здоровый ребенок начинает разговаривать, признаком аутизма может быть отсутствие речи в 2 и 3 года
- Постепенно выявляются сложности во взаимодействии с другими детьми
   — это основной симптом раннего детского аутизма



#### Виды аутизма



- эмоциональная бедность
- нарушение социализации
- стереотипные движения
- нарушения речи
- агрессия
- когнитивные расстройства

## Причины аутизма у детей

- Аутизм не является наследственным заболеванием, для него не характерна семейственность.
- Образование определенных комбинаций генов, которые, по мнению ученых, становятся причиной рождения детей с аутизмом, происходит в результате спонтанных мутаций, которые могут быть связаны в том числе с воздействием внешних факторов
- токсины,
- инфекции,
- гипоксия плода.



## Лечение аутизма у детей



- Психологическая помощь
- Нетрадиционные методы терапии
- Диета при аутизме у детей
- Медикаментозная терапия аутизма

# Особенности обучения и воспитания детей с аутизмом

- Аутисты часто неправильно используют слова, строят бессмысленные фразы, повторяют их. Работа с детьми с аутизмом обязательно должна включать в себя упражнения, расширяющие словарный запас и формирующие правильную речь.
- Обучение в школе возможно при аутизме в легкой форме. Тяжелый аутизм, особенно сопровождающийся умственной отсталостью показание к индивидуальному обучению.
  - При задержке умственного развития рекомендуется использовать специальные развивающие игрушки для детей с аутизмом.



#### Дифференциальная диагностика

- Патология слуха, зрения, которые могут имитировать характерное для аутизма безразличие к окружающему миру.
- Депривационный синдром, развивающийся при длительном отлучении ребенка от матери и не имеющий генетической природы. При восстановлении контакта с матерью проявления с высокой долей вероятности исчезают.
- Умственная отсталость напоминает по своим проявлениям аутизм, но в этом случае дети не испытывают сложностей с проявлением эмоций.
- Шизофрения имеет проявления, сходные с синдромом Аспергера, на начальном этапе изучения аутизма его считали формой данного заболевания. Диагностируют шизофрению не раньше 3 лет, когда возникает возможность проведения специальных тестов.
- Во взрослом возрасте чаще всего дифференциальная диагностика проводится с депрессивными расстройствами и шизофренией.





- Диагноз аутизм это не приговор.
- Прогноз относительно жизни с аутизмом благоприятный опасности заболевание не представляет, хотя на качество жизни оказывает значительное влияние.
- Будущее человека зависит от выраженности симптомов, степени развития речи, интеллекта.
- Легкие формы аутизма могут мешать нормальной жизни совсем незначительно.
- При создании комфортных условий для аутиста, получении подходящей профессии, не связанной с общением с людьми, он может вести обычный образ жизни, не испытывая особых проблем.