



СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕН

ДОКЛАДЧИК :  
СТУДЕНТ 1722 ГР.  
3 КУРСА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
ЗАГОРСКАЯ СОФИЯ ЮРЬЕВНА



# КРОВОТЕЧЕНИЕ

Выход крови из кровеносного русла.

Массивные кровотечения из ЖКТ нередко являются причиной развития угрожающего жизни геморрагического шока.



СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

## 3



Показатели	Легкая степень	Средняя степень	Тяжелая степень
Общее состояние	Удовлетворительное	Средней тяжести	Тяжелое, шок
Число эритроцитов	$> 3,5 \times 10^{12} / \text{л}$	$3,5 \times 10^{12} / \text{л} - 2,5 \times 10^{12} / \text{л}$	$< 2,5 \times 10^{12} / \text{л}$
Уровень гемоглобина, г/л	$> 100$	80-100	$< 80$
Частота пульса за 1 мин	До 80	80-100	Выше 100
Постуральная гипотензия	Нет	Выражена	Выражена
Систолическое АД, мм рт. ст.	$> 110$	110-90	$< 90$
ЦВД, см вод. ст.	5-15	1-5	$< 1$
Нарушение сознания	Нет	Тревога, испуг	Возбуждение, дезориентация, кома
Гематокрит, %	$> 30$	25-30	$< 25$
Потеря ОЦК от нормы, %	До 20	20-30	Свыше 30
Диурез, мл/сут	$> 1550$	$< 1000$	$< 300$

# КЛИНИКА



## Рвота:

- алой кровью
- тёмной кровью
- по типу «кофейной

гущи»

**Кровянистая слизь**

**Мелена**



СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА



- Лёгочное кровотечение
- ИБС
- Заглатывание крови при носовом кровотечении



СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ



## Нельзя!

оставлять человека в таком состоянии в одиночестве и нельзя давать ему пить. Для утоления жажды позволяют проглотить несколько кусочков льда, что притормаживает развитие желудочного кровотечения.

1. Вызвать СМП
2. Уложить человека горизонтально, приподнять его ноги
3. Положить лед на живот
4. Если больной в сознании, выяснить у него два вопроса:
  - не болен ли человек язвенной болезнью;
  - была ли рвота за сутки до события;
5. До приезда СМП следует держать под контролем дыхание и пульс
6. В случае остановки дыхания прибегают к непрямому массажу сердца
7. Перемещают пациентов в тяжелом состоянии на носилках, причем голова должна находиться ниже уровня корпуса тела



СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ДОГОСПИТАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ



- Мониторинг или контроль АД и ЧСС
- Поддержка витальных функций
- Переливание жидкости в/в



СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



# БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ