

Кипарис

Произрастание.
Кипарисы растут в субтропическом и тропическом климате северного полушария, распространены в Средиземноморье, на Черноморском побережье Кавказа и Крыма, в Сахаре, Гималаях, на юге Китая и в Америке от Гватемалы до Орегона.



Происхождение

Ныне живущие виды кипариса — очень давнего происхождения; ископаемые и их хорошо сохранившиеся остатки встречаются уже в третичной формации.





200-
летний кипарис, с
которым был
дружен Пушкин.



Сосна

ПИЦУНДСКАЯ

На территории РФ произрастает не более чем на 100 га, причем из них 950 гектаров (это самый большой в мире массив) находится

между

с. Дивноморское (Дивноморск) и Прасковеевской щелью.

Небольшие ареалы пицундской сосны так же встречаются в районе Дообского маяка, на хребтах Маркотх и Туапхат, в окрестностях с. Бжид и Ольгинка.

Растёт на скалистых и песчаных береговых склонах, поднимается до 700 метров над уровнем моря, причем искусственные насаждения намного превышают естественные.

Малотребовательна к почвенным условиям и влаге. Плодоношение начинается в возрасте 20-25 лет. Занесена в Красную книгу России.



Значение и применение

Древесина идёт на обшивку судов и различные изделия.

Даёт много смолы и скипидара.

Разводится как садово-парковое растение.



- Джанхот:
бор пицундской
- СОСНЫ.



Лавр

Биологическое описание

Лавр

Вечнозелёные растения.

Листья очерёдные,
кожистые, цельнокрайние;
содержат большое
количество эфирных масел.

Цветки собраны
в зонтиковидные пазушные
соцветия.

Плоды синие-
чёрные, костянковидные, од-
носемянные.



Род насчитывает три вида:

(1960) — Лавр азорский,

(1753) — Лавр благородный,

(1814)- Лавр канарский.

Лавр Азорский.



Лавр благородный.



Лавр канарский



- Листья лавра широко известны в мире как приправа



Вопросы

- 1) В каком полушарии произрастает кипарис?
- «В северном».
- 2) Где находится бор пицундской сосны?
- «В Джанхоте»
- 3) Какие три вида лавра существуют?
- « (1) Лавр азорский, (2) Лавр благородный, (3) Лавр канарский.

Спасибо за внимание!

