

Адгезивные препараты

(порошки, кремы,
кондиционеры)

Используются как один из методов улучшения фиксации съёмных протезов. При их применении заметно улучшается функция жевания, вы сможете быстрее адаптироваться к протезу.

1

Фиксирующие препараты
используют только для нижней
челюсти

2

Они увеличивают вязкость слюны,
что способствует улучшению
фиксации и стабилизации
протезов

3

Оказывают профилактическое
действие возникновению
протезных стоматитов



Наш адрес

Москва, ул. Долгоруковская д.4, стр.2, 1
этаж
(проезд от ст. метро “Новослободская”)




График работы

будние дни с 9:00 до 20:00,
суббота с 9:00 до 16:00



www.msmsu.ru



Регистратура: 8(499)978-01-21
8(499)973-04-05

**Отделение ортопедической
стоматологии №1**

Памятк

а

*По уходу за съёмными
пластинчатыми протезами*

Кафедра ортопедической стоматологии
и гнатологии МГМСУ



Адаптация

К съёмной ортопедической конструкции

Для достижения быстрых положительных результатов при использовании протезом Вам необходимо терпеливо выполнять все требования врача, связанные с правилами ухода и пользования данной конструкцией:

Эксплуатация

Первую неделю носить протез днём и по возможности ночью, снимать только для гигиенической обработки

Речь

Первые дни читать вслух и больше разговаривать

Боль

В случае необходимости сразу обратиться к врачу для устранения причины неудобств или травмы. Наденьте протез за 2 часа до приёма.

Питание

Первое время употреблять мягкую пищу, медленно пережевывая

“Лучше ложки к обеду
только зубы”

Правила пользования

**Помните! Протез восстанавливает
всего
лишь 60% жевательной
эффективности.**

Гигиена

- 1
 - Используйте специальную щётку
 - Мойте протез после каждого приёма пищи
 - Храните в закрытом контейнере/стакане с холодной водой
 - Используйте очищающие таблетки (например, Corega)

2 Нагрузка

Не рекомендуется употребление чрезмерно грубой или жесткой пищи (орехи, сухари). Измельчайте труднопережевываемую пищу с помощью столового ножа

3 Посещение врача-стоматолога -

Новый протез будет давить и натирать, прийти на первую коррекцию нужно через несколько дней после получения протеза.

- Планово посещайте вашего врача раз в 6 месяцев



Срок службы

Максимальный срок использования

3-4 года

Для изготовления нового протеза обратитесь к вашему врачу-стоматологу:

◇ Ф.И.О. доктора

◇ Телефон/электронная почта