Адгезивные препараты

(порошки, кремы, кондиционеры)

Используются как один из методов улучшения фиксации съёмных протезов. При их применении заметно улучшается функция жевания, вы сможете быстрее адаптироваться к протезу.

1

Фиксирующие препараты используют только для нижней челюсти

2

Они увеличивают вязкость слюны, что способствует улучшению фиксации и стабилизации протезов

3

Оказывают профилактическое действие возникновению протезных стоматитов

Наш адрес

Москва, ул. Долгоруковская д.4, стр.2, 1 этаж

(проезд от ст. метро “Новослободская”)



График работы

будние дни с 9:00 до 20:00,
суббота с 9:00 до 16:00

W W W.MSMSU.RU

Регистратура: 8(499)978-01-21
8(499)973-04-05

Отделение ортопедической стоматологии №1

Памятка

По уходу за съёмными пластиночными протезами

Кафедра ортопедической стоматологии и гнатологии МГМСУ

Адаптация

К съемной ортопедической конструкции

Для достижения быстрых положительных результатов при пользовании протезом Вам необходимо терпеливо выполнять все требования врача, связанные с правилами ухода и пользования данной конструкцией:

Эксплуатация

Первую неделю носить протез днём и по возможности ночью, снимать только для гигиенической обработки

Боль

В случае необходимости сразу обратиться к врачу для устранения причины неудобств или травмы. Наденьте протез за 2 часа до приёма.

Речь

Первые дни читать вслух и больше разговаривать

Питани

Первое время употреблять мягкую пищу, медленно пережевывая

“Лучше ложки к обеду только зубы”

Правила пользования

Помните! Протез восстанавливает всего

лишь 60% жевательной эффективности.

1 Гигиена

- Используйте специальную щётку
- Мойте протез после каждого приёма пищи
- Храните в закрытом контейнере/стакане с холодной водой
- Используйте очищающие таблетки (например, Corega)

2 Нагрузка

Не рекомендуется употребление чрезмерно грубой или жесткой пищи (орехи, сухари).
Измельчайте труднопережёвываемую пищу с помощью столового ножа

3 Посещение врача-стоматолога

Новый протез будет давить и натирать , прийти на первую коррекцию нужно через несколько дней после получения протеза.

- Планово посещайте вашего врача раз в 6 месяцев

Срок службы

Максимальный срок использования

3-4 года

Для изготовления нового протеза обратитесь к вашему врачу-стоматологу:

- Ф.И.О. доктора
- Телефон/электронная почта