

МНН	Исследование	Продолжительность	Кол-во пациентов	Исследуемые комбинации / Дизайн	Первичная конечная точка
Амбризентан	ARIES-1	12 недель	202	Амбризентан моно vs плацебо	T6MX
	ARIES-2	12 недель	192		T6MX
Бозентан	Исследование-351	12 недель	32	Бозентан моно vs плацебо	T6MX
	BREATHE-1	16 недель	213		T6MX
	EARLY	24 недель	185		ЛСС(PVR), T6MX
Риоцигуат	PATENT 1	12 недель	443		T6MX
Силденафил	SUPER-1	12 недель	277	Силденафил моно vs плацебо	T6MX
Мацитентан	SERAPHIN	115 недель	742	1) Мацитентан моно vs плацебо 2) Мацитентан в комбинации с иФДЭ-5 vs плацебо в комбинации с иФДЭ	Время до наступления первого события прогрессирования заболевания/смерти
Селексипаг	GRIPHON	70,7 недель	1 156	1) Селексипаг моно vs плацебо 2) Селексипаг в комбинации с APЭ vs плацебо в комбинации с APЭ 3) Селексипаг в комбинации с APЭ и иФДЭ-5 vs плацебо в комбинации с APЭ и иФДЭ-5	Время до наступления первого события прогрессирования заболевания/смерти