

22.09.2017  
Классная работа

Урок №4  
**Природный газ. Алканы**

## Урок №4. Природный газ. Алканы

- **План урока**

- 1) Природный газ. Состав природного газа.
- 2) Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива.
- 3) Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов

- **1) Природный газ. Состав природного газа**
- **Природный газ** — смесь газов, образовавшихся в недрах Земли при анаэробном разложении органических веществ.
- Природный газ относится к полезным ископаемым.
- Природный газ в пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) находится в газообразном состоянии – в виде отдельных скоплений (газовые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, либо в растворённом состоянии в нефти или воде. При нормальных условиях (101,325 кПа и 0°C) природный газ находится только в газообразном состоянии.
- Также природный газ может находиться в кристаллическом состоянии в виде естественных газогидратов.
- Чистый природный газ не имеет цвета и запаха.

## Урок №4. Природный газ. Алканы

- **Химический состав**

- Основную часть природного газа составляет метан ( $\text{CH}_4$ ) – от 70 до 98 %. В состав природного газа могут входить более тяжёлые углеводороды – гомологи метана:
  - этан ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ),
  - пропан ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ),
  - бутан ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ).
- Природный газ содержит также другие вещества, не являющиеся углеводородами:
  - водород ( $\text{H}_2$ ),
  - сероводород ( $\text{H}_2\text{S}$ ),
  - диоксид углерода ( $\text{CO}_2$ ),
  - азот ( $\text{N}_2$ ),
  - гелий (He) и другие инертные газы.

- **2) Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед другими видами топлива**
- Природный газ широко используется в качестве топлива, поскольку имеет высокую теплотворную способность (1 м<sup>3</sup> газа дает при сжигании 55000 кДж энергии). Это свойство природного газа используют в промышленности для производства стали и стекла.
- $\text{CH}_4$  [газ] +  $2\text{O}_2$  [газ] →  $\text{CO}_2$  [газ] +  $2\text{H}_2\text{O}$  [пар] + 891 кДж.
- Природный газ широко применяется в качестве горючего в жилых, частных и многоквартирных домах для отопления, подогрева воды и приготовления пищи; как топливо для машин (газобаллонное оборудование автомобиля, газовый двигатель), котельных, ТЭЦ, различной техники и др.
- Сейчас он используется в химической промышленности, как исходное сырьё для получения различных органических веществ, например, пластмасс.
- Для обнаружения утечек газа без использования специальных приборов в него добавляют в безвредных концентрациях этантиол, обладающий резким характерным запахом.

## Урок №4. Природный газ. Алканы

- **Трагедии, вызванные взрывом природного газа**
- Взрыв газа, который произошел 13 октября 2007 года в Днепропетровске в 10-этажном доме по адресу: ул. Мандрыковская, 127 является одной из самых масштабных украинских трагедий. Взрыв произошел в третьем подъезде дома и раздался 13 октября 2007 около 10:30. Он был таким масштабным, что чуть не разрушил соседние здания. Подъезд был разрушен полностью, еще три других подъезда тоже повреждены. Всего погибли 23 человека, еще 20 были ранены.



## Урок №4. Природный газ. Алканы

- Железнодорожная катастрофа под Уфой – крупнейшая в истории России и СССР железнодорожная катастрофа, произошедшая 4 июня (3 июня по московскому времени) 1989 года в Иглинском районе Башкирской АССР в 11 км от города Аша (Челябинская область) на перегоне Аша – Улу – Теляк. В момент встречного прохождения двух пассажирских поездов №211 «Новосибирск – Адлер» и №212 «Адлер – Новосибирск» произошёл мощный взрыв облака лёгких углеводородов, образовавшегося в результате аварии на проходящем рядом трубопроводе «Сибирь – Урал – Поволжье». Погибли 575 человек, 181 из них – дети, ранены более 600.



## Урок №4. Природный газ. Алканы

- Яркая туркменская достопримечательность – 60 метровая воронка с горящим газом. В советские годы во время обширных исследований земных недр в этом месте геологи проводили бурение на газ прямо над полостью о существовании которой никто не подозревал. В какой-то момент свод не выдержал и оборудование вместе с людьми провалилось метров на 20. Из образовавшегося кратера стал идти газ, который впоследствии подожгли. Так он и горит до сих пор







- **3) Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов**
- **Углеводороды** – это соединения, молекулы которых содержат только атомы углерода и водорода. Общая формула всех углеводородов –  $C_xH_y$ , к ним относится огромная группа органических соединений.
- Однако лишь единственное из них – метан – содержит один атом углерода, остальные имеют в своем составе связанные друг с другом атомы углерода, начиная с двух (этан, этилен, ацетилен) и заканчивая тысячами в высокомолекулярных углеводородах.
- Углеводороды можно рассматривать как фундамент органической химии.

## Урок №4. Природный газ. Алканы


- **Алканы** являются *насыщенными*, или *предельными*, углеводородами, поскольку все свободные валентности атомов углерода заняты (полностью «насыщены») атомами водорода. Простейшим представителем алканов служит метан  $\text{CH}_4$ . Начиная с него, можно построить ряд, в котором каждый последующий углеводород отличается от предыдущего на одну группу  $\text{CH}_2$ . Члены этого ряда называются гомологами, а сам ряд – гомологическим.
- *Общая формула гомологического ряда алканов  $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ .*



метан



этан






пропан

## Урок №4. Природный газ. Алканы

- **Строение.** Каждый атом углерода в алканах находится в состоянии  $sp^3$ -гибридизации и образует четыре  $\sigma$ -связи С–С и С–Н, углы между которыми равны  $109,5^\circ$ .
- Длина связи С–С в алканах равна 0,154 нм.
- Напомним, что атом углерода образует  $\sigma$ -связь за счет перекрывания гибридных орбиталей ( $sp^3$ -,  $sp^2$ -, или  $sp$ -атомных орбиталей) с гибридными орбиталями другого атома углерода или любыми орбиталями атомов других элементов. Перекрывание осуществляется таким образом, что область максимальной электронной плотности сосредотачивается в пространстве на прямой, соединяющей ядра атомов. Такое перекрывание оказывается наиболее эффективным, а возникающие при этом  $\sigma$ -связи оказываются наиболее прочными.


## Урок №4. Природный газ. Алканы

- **Изомерия.** Основу молекул алканов составляет углеродный скелет, который может принимать самые разные геометрические формы при сохранении длин связей и углов между связями.
- Например, углеродная цепь пентана  $C_5H_{12}$  может выглядеть следующим образом:




## Урок №4. Природный газ. Алканы

- **Основной вид изомерии для алканов – изомерия углеродного скелета.**
- Начиная с  $C_4H_{10}$ , одной и той же молекулярной формуле отвечают несколько алканов, различающихся строением углеродного скелета (т.е., числом атомов углерода в главной цепи и/или положением заместителей). Число возможных изомеров  $C_nH_{2n+2}$  резко увеличивается с ростом  $n$ .
- Для бутана  $C_4H_{10}$  известны два изомера:



бутан



2-метилпропан


- Для пентана  $C_5H_{12}$  известно три изомера, для гексана  $C_6H_{14}$  – 5, для гептана  $C_7H_{14}$  – 9, для октана  $C_8H_{18}$  – 18, для нонана  $C_9H_{20}$  – 35, для эйкозана  $C_{20}H_{42}$  – 366319. Для каждого  $n$  существует единственный изомер с неразветвленным углеродным скелетом, он называется *нормальным*.

## Урок №4. Природный газ. Алканы

- Если у молекулы алкана отнять один атом водорода, то получаются углеводородные радикалы с одной свободной валентностью. Общая формула предельных углеводородных радикалов  $C_nH_{2n+1}$ .




- Начиная с  $C_3H_7-$ , для радикалов возможна *структурная изомерия*, связанная со строением углеродного скелета или с положением свободной валентности. Так, два радикала  $C_3H_7-$  (пропил и изопропил) имеют одинаковый углеродный скелет, однако в пропиле свободная валентность находится у первичного атома углерода, а в изопропиле – у вторичного.



## Урок №4. Природный газ. Алканы

- Атом углерода, образующий одну связь С–С, называют *первичным*, две связи С–С – *вторичным*, три связи С–С – *третичным* и четыре связи С–С – *четвертичным*. Третичные и четвертичные атомы содержатся только в алканах с разветвленной цепью.
- В приведенной ниже структурной формуле буквами а, к, l, m, n обозначены первичные атомы углерода, буквами d, e, f, g, h – вторичные; третичный атом показан буквой b, а четвертичный – буквой с:



- Если в структуре имеются только первичные и вторичные атомы углерода, то такой углеродный скелет называется неразветвленным. Наличие третичных и (или) четвертичных атомов углерода обуславливает разветвление углеродного скелета.

## Урок №4. Природный газ. Алканы

- **Номенклатура.** По систематической номенклатуре ИЮПАК первым четырем членам гомологического ряда алканов присвоены их исторически сложившиеся названия – метан, этан, пропан, бутан. Названия остальных алканов с нормальной, т.е. неразветвленной углеродной цепью, состояются из греческого названия числительного, соответствующего числу атомов углерода в цепи, с добавлением суффикса –**ан**. Так, греческое название числительного – «гекса», отсюда углеводород  $C_6H_{14}$  называется гексан. Для этого же соединения можно встретить название *n*-гексан, что подчеркивает наличие нормальной цепи.
- Названная первых десяти членов гомологического ряда алканов лежат в основе заместительной номенклатуры и их полезно запомнить




## Урок №4. Природный газ. Алканы

Строение	Число атомов углерода	Название
$\text{CH}_4$	1	Метан
$\text{CH}_3\text{CH}_3$	2	Этан
$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$	3	Пропан
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH}_3$	4	Бутан
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	5	Пентан
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$	6	Гексан
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$	7	Гептан
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$	8	Октан
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$	9	Нонан
$\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{CH}_3$	10	Декан

## Урок №4. Природный газ. Алканы

- Алканы с разветвленной цепью рассматриваются как производные нормального алкана, в котором один или несколько атомов водорода замещены на углеводородные радикалы. Для этого выбирают главную углеродную цепь, которая содержит наибольшее число атомов углерода и составляет основу названия. Главную цепь нумеруют с того конца, ближе к которому находится заместитель. Перед основой названия указывают номер атома углерода, при котором находится заместитель, и название этого заместителя, например:



**2-метил-4-этилгексан**

## Урок №4. Природный газ. Алканы

- **Тренировочные упражнения**
- **Задача 1.** Напишите все структурные изомеры пентана, гексана и гептана и назовите их.
- **Задача 2.** Напишите структурную формулу 2,2,5,5-тетраметилгексана. Напишите формулу его изомера, имеющего в качестве заместителей при основной цепи только этильные радикалы.
- **Задача 3.** Напишите формулу 2,2,5,5-тетраметилгексана. Приведите формулу его изомера, в молекуле которого имеются только четыре первичных атома углерода.

## Урок №4. Природный газ. Алканы

- **Домашнее задание**
- Учить §17 (стр.77-79), §7, 8.
- Выполнить задания
- к §17 №3,
- к §7 №2, 7, тесты 1–3,
- к §8 №5, 6, тесты 1–3