

«ДОСЛІДЖЕННЯ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ ЯК МЕДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ»




Виконала: Любушкіна Ангеліна
Наукові керівники: к.фарм.н. Доц. Волкова А.В.
ас. Ноздріна А.А.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ



Регуляція обміну
білків, жирів,
вуглеводів

Фільтрація
(знешкодження
токсичних речовин)




Імунна функція
(синтез
імуноглобуліну,
холестерину)

Депо вітамінів
мінералів вугдеводів




Травна (синтез
жовчі)

Регулювання
згортання крові



ХАРАКТЕРНІ СИМПТОМИ ГЕПАТИТІВ:

- ВТОМА
- ГРИПОЗНІ ПРОЯВИ
- ЖОВТЯНИЦЯ
- БІЛЬ В ПРАВМУ ПІДРЕБЕР'І




РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А ТА

ВГ

Е




ВГ




За даними ВОЗ, 2017 рік

Розповсюдження вірусного гепатиту В та С *

257 МЛН ГВ



71 МЛН ГС



За даними ВООЗ, 2015 рік

Кількість зареєстрованих випадків вірусного гепатиту В та С в Україні станом на 1.01.2020р.


В Україні в останнє десятиліття зросла на 77% захворюваність на хронічні гепатити.




Печінка довго мовчить про свої недуги.
Біль у правому підребер'ї – це вже доволі грізний симптом.

Станом на 1.01.2020 р.	Гепатит В	Гепатит С
Зареєстровано нових випадків	1848	7179
Проліковано у 2019 р.	1829	7302
Всього інфіковано	559341	1342418


РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ




Чи можна інфікуватися вірусним гепатитом користуючись спільними предметами навчання та побуту з особою, інфікованою вірусним гепатитом



Чи можна інфікуватися вірусним гепатитом при потисканні рук, дружніх обіймах




Вірусним гепатитом можна інфікуватися через спільне користування туалетом, ванною, рушником, МИЛОМ




Вірусним гепатитом можна інфікуватися під час розмови, кашлю


РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ




Вірусним гепатитом можна інфікуватися при переливанні крові, гемодіалізі



Вірусним гепатитом можна інфікуватися при нанесенні татуювань на шкіру




Вірусним гепатитом можна інфікуватися в косметичному салоні (педикюр, манікюр, інші процедури):




Чи можна інфікуватися вірусним гепатитом при сексуальних стосунках, не використовуючи засіб індивідуального захисту (презерватив)


РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТНОГО ОПИТУВАННЯ




Якщо виявиться, що в колективі хтось із Вашого оточення захворів на вірусний гепатит, ви зможете спокійно перебувати з ним в одному приміщенні?



Студенти/колеги в групі мають знати про людину, яка інфікована вірусним гепатитом



Я почувався б спокійно, користуючись одними предметами побуту разом із колегою, який має вірусний гепатит:



Якщо виявиться, що член моєї родини інфікований вірусним гепатитом, я буду тримати це в секреті?

Розподіл відсотка вакцинованих дітей до року за областями України 2017-2020 рр.

Область України	2017,0	2018,0	2019,0	2020,0	Темпи приросту
Вінницька	81,7	87,3	80,8	98,8	21,0
Волинська	57,4	73,5	80,0	99,8	73,9
Дніпропетровська	74,0	96,1	93,5	100,0	35,1
Донецька	80,4	85,6	72,7	94,9	18,0
Житомирська	71,0	78,4	80,2	95,1	33,9
Закарпатська	54,2	73,1	54,6	91,5	68,9
Запорізька	100,0	95,2	75,9	100,0	0,0
Ів.-Франківська	69,7	72,3	75,2	90,4	29,7
Київська	84,2	93,3	81,0	97,3	15,6
Кіровоградська	77,3	92,9	80,9	99,9	29,2
Луганська	0,0	85,3	89,6	97,8	14,7
Львівська	68,3	77,3	67,5	100,0	46,4
Миколаївська	94,7	88,3	90,8	98,3	3,8

Область України	2017,0	2018,0	2019,0	2020,0	Темпи приросту
Одеська	64,6	73,8	60,1	96,4	49,3
Полтавська	93,2	87,3	93,7	96,0	3,0
Рівненська	73,8	77,5	61,1	91,5	24,0
Сумська	99,5	97,3	91,6	93,1	-6,5
Тернопільська	73,9	62,0	71,8	100,0	35,2
Харківська	71,7	70,8	76,1	95,5	33,2
Херсонська	94,8	99,1	73,6	98,2	3,6
Хмельницька	83,4	92,5	73,0	99,6	19,5
Черкаська	99,1	84,3	77,5	100,0	1,0
Чернівецька	90,9	98,7	76,6	100,0	10,0
Чернігівська	89,2	94,2	81,6	98,1	9,9
м.Київ	78,1	78,9	84,8	90,8	16,2
ПО УКРАЇНІ	77,4	82,9	77,0	96,5	24,7

**СТАНДАРТ
МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ
«ВІРУСНИЙ
ГЕПАТИТ С У
ДОРΟΣЛИХ»**

Затвердження:
2021р.

**ПРИОРИТЕТНІ
ГРУПИ ЛЗ**


J05AP55
Софосбувір/
велпатасвір

J05AP51
Софосбувір та
ледіпасвір


J05AP08
Софосбувір +
J05AP07
Даклатасвір.

Назва ЛП	Виробник	Ціна та наявність в аптеках в квітні 2021 р.	Ціна та наявність в аптеках в квітні 2020 р.	Реєстрація
J05AP51 Софосбувір / ледіпасвір				
КЮРЛЕД-ЛП	СтрайдеФармаСайенс Лімітед, Індія	---	---	30.05.2019 30.05.2024
ВІРПАС	СтрайдеФармаСайенс Лімітед, Індія	---	5390,00	20.11.2018 20.11.2023
СОФГЕН-Л	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	4200	4896,00	07.11.2018 07.11.2023
ХАРВОНІ	Гілеад Сайенсиз, Інк., США	---	12024,00	29.03.2017 29.03.2022
ЛЕДВИР	МайланЛабораторіз Лімітед, Індія	---	---	01.06.2020 01.06.2025
J05AP55 Софосбувір/ велпатасвір				
МАЙХЕП ОЛЛ	МайланЛабораторіз Лімітед, Індія	---	---	22.12.2020 22.12.2025
ЕПКЛЮЗАТ™	ГілеадСайенсиз Інтернешнл Лтд, США	---	5800,00	31.10.2018 31.10.2023
ВЕЛПАНАТ	НаткоФармаЛімітед, Індія	---	---	26.03.2021 31.03.2022
J05AP08 Софосбувір				
МАЙХЕП	МайланЛабораторіз Лімітед, Індія	---	---	12.10.2020 12.10.2025
КЮРЛЕД	СтрайдеФармаСайенс Лімітед, Індія	---	---	30.05.2019 30.05.2024
МАЙГЕП	МайланЛабораторіз Лімітед, Індія	---	---	12.10.2020 12.10.2025
СОФГЕН	Гетеро ЛабзЛімітед, Індія	2400	2028,95	07.11.2018 07.11.2023
ВІРСО	СтрайдеФармаСайенс Лімітед, Індія	---	4986,00	07.11.2018 07.11.2023
J05AP07 Даклатасвір.				
МАЙДЕКЛА	МайланЛабораторіз Лімітед, Індія	---	---	25.02.2020 25.02.2025
ВІРДАК 60	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	2300	2550,00	24.01.2019 24.01.2024


Розподіл ЛЗ за країнами-виробниками



Наявність ЛЗ в аптеках, станом на 1 квітня 2021 р.



Наявність ЛЗ в аптеках, станом на 1 квітня 2020 р.



* За даними ДРЛЗ станом на 1.04.2021р.

Епідеміологічні критерії для першочергового лікування

Клінічні критерії для першочергового лікування

Пацієнти з вираженим фіброзом або цирозом печінки, у тому числі з декомпенсованим цирозом печінки

Пацієнти з ризиком швидкого розвитку захворювання печінки внаслідок супутніх захворювань (реципієнти трансплантатів інших органів, пацієнти з цукровим діабетом, ВГВ, ВІЛ-інфіковані, особи, які зловживають алкоголем, особи з метаболічним синдромом).

Пацієнти з клінічно вираженими позапечінковими проявами

Пацієнти з рецидивом ВГС після трансплантації печінки;

Особи, які належать до групи ризику щодо передачі ВГС:

Особи, які вживають наркотичні засоби ін'єкційним шляхом;

Чоловіки, які мають статеві стосунки з чоловіками;

Жінки репродуктивного віку, які планують вагітність;

Пацієнти, які перебувають на гемодіалізі;

Ув'язнені особи;

Медичні працівники.

ВИСНОВКИ:

- ✓ Таким чином, проведений аналіз показав, що вірусні гепатити представляють собою глобальну медико-соціальну проблему. Серед них найбільш тяжкі наслідки мають випадки інфікування гепатитом В та С.
- ✓ Дослідження рівня знань стосовно вірусних гепатитів, а саме профілактики, усвідомлення особистого ризику зараження виявило, що переважна більшість опитаних знає про парентеральні шляхи передачі вірусу гепатита В або С, насторожено ставиться до спільного використання побутовими предметами із інфікованими та у суспільстві намагатиметься приховувати факт цього захворювання, хоча й вважають, що в колективі мають знати про людину, яка інфікована вірусним гепатитом.
- ✓ Вчасно розпочате противірусне лікування ВГС знижує ризик або повністю запобігає розвитку таких ускладнень як некротичне запалення печінки, фіброз, цироз печінки, ГЦК, тяжким позапечінковим проявам, впливає на покращення якості життя пацієнтів і запобігає подальшій передачі вірусу. Низька фізична та економічна доступність ЛЗ, повна імпортозалежність викликає значне занепокоєння.
- ✓ Досягнувши 100% рівня вакцинації дітей віком до 1 року, можна буде починати казати про початок елімінації гепатиту В в Україні.

**ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !
БУДЬТЕ ЗДОРОВІ !**

