

ИНТЕЛЛЕКТ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

Подготовила Шитова Светлана, 2 курс, группа
лого-2

Интеллект

Качество психики, состоящее из способности осознавать новые ситуации, способности к обучению и запоминанию на основе опыта, пониманию и применению абстрактных концепций, и использованию своих знаний для управления окружающей человека средой

Интеллектуальные нарушения

состояние, обусловленное нарушениями структуры и функций мозга и его реакциями на эти нарушения.

При анализе клиники интеллектуальных нарушений на первый план выступает нарушение способности формировать **понятия, суждения, умозаключения** адекватные действительности.

Основные формы интеллектуальных нарушений

1. **умственная отсталость** (иначе олигофрения), при которой отсутствует нарастание интеллектуального дефекта
2. **деменция**, которая представляет собой распад более или менее сформированных интеллектуальных функций

Причины

Умственная отсталость

- патологическая наследственность
- Хромосомные нарушения
- Органические поражения мозга и т.д.

Деменция

- Шизофрения
- Эпилепсия
- Воспалительные заболевания мозга
- Травмы мозга (сотрясения, ушибы)
- Хромосомные нарушения
- И т.д.

Симптомы олигофрении

Характерной особенностью олигофрении является всестороннее и всеобъемлющее поражение. *Страдает не только интеллект, но и другие функции: речь, память, воля, эмоции, способность концентрировать внимание, воспринимать и перерабатывать информацию.* В большинстве случаев наблюдаются двигательные нарушения различной степени выраженности. При многих заболеваниях, провоцирующих олигофрению, выявляются соматические и неврологические расстройства.

Страдает образное мышление, способность к обобщениям и абстрагированию. Мышление больных с тяжелой олигофренией напоминает мышление детей младшего возраста. При легких формах олигофрении нарушения выражены менее ярко, однако обращает на себя внимание конкретность мыслительных процессов, неспособность выйти за рамки текущей ситуации. Способность к концентрации внимания снижена.

Память обычно ослаблена, в отдельных случаях при олигофрении наблюдается хорошее избирательное механическое запоминание простых данных: имен, названий, цифр. Речь скудная, упрощенная.

Наблюдается более или менее выраженное *снижение способности к решению повседневных житейских вопросов.* Уровень критики снижен.

Олигофрения подразделяется

на:

1. **дебильность** - слабо выраженная умственная отсталость
2. **имбецильность** - средне выраженная умственная отсталость
3. **идиотию** - крайне выраженная умственная отсталость

Олигофрения по МКБ-10

1. Легкая степень расстройства (F70) диагностируется при тестовых данных IQ в пределах 50 — 69 баллов.
2. Умеренная степень (F71) диагностируется при IQ в пределах 35 — 49 баллов,
3. Тяжелая степень (F72) — при IQ в пределах 20—34 баллов,
4. Глубокая (F73) — при IQ ниже 20 баллов.

Симптомы деменции

Как симптом деменции следует отметить проблемы, возникающие с памятью человека, его мышлением, речью и поведенческими реакциям.

А именно:

- Нарушение кратковременной и долговременной памяти
- По меньшей мере, одно из следующего:
 1. Нарушение абстрактного мышления
 2. Нарушение критики, обнаруживаемое как неспособность строить реальные планы в отношении окружающих, родственников и вопросов, связанных с работой
 3. Нейропсихологические симптомы и синдромы: афазия, апраксия, агнозия, а также нарушение оптико-пространственных функций и конструктивной деятельности.
 4. Личностные изменения.
 - Социальная дезадаптация в семье и на работе.
 - Отсутствие проявлений делирия в период деменции

Виды деменции

1. Эпилептическая
2. Шизофреническая
3. Посттравматическая (органическая)
4. Болезнь Геллера (скоротечная инфантильная деменция)
5. Парциальная (частичная, лакунарная)
6. Глобальная (тотальная)
7. Болезнь Пика
8. Болезнь Альцгеймера