

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России

Аллергические реакции и доврачебная помощь при их возникновении




**РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА:
СТУДЕНТКА 108 ГРУППЫ
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
ДИМОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВНА**

Тверь
2021



Термин «аллергия» –
1906 г. ввел
австрийский педиатр
К. Пирке.

Аллергические
реакции - реакции
гиперчувствительност
и иммунной системы,
не имеющие
защитного значения
для организма и
развивающиеся в
ответ на воздействие
антигенов,
называемых
аллергенами.



Аллергены



укусы насекомых



употребление в пищу некоторых продуктов



индивидуальная непереносимость лекарственных средств и т.п.

- Аллергические реакции
 - Крапивница
- Ангioneвротический отёк (отёк Квинке)
- Анафилактический шок

Крапивница

Крапивница характеризуется появлением зудящей, эритематозной сыпи, элементы которой возвышаются над поверхностью кожи. Первичным элементом при крапивнице является волдырь.





Ангионевротический отёк (отёк Квинке)

Отек Квинке — острое состояние, характеризующееся возникновением отеков кожи и слизистых оболочек, реже внутренних органов и мозговых оболочек.



Анафилактический шок

Анафилактический шок - острая системная аллергическая реакция на повторный контакт с аллергеном, угрожающая жизни и сопровождающаяся выраженными гемодинамическими нарушениями, а также нарушением функций других органов и систем.



Доврачебная помощь



- Прекратить введение аллергена.
- Придать больному горизонтальное положение и приподнять ноги вверх для улучшения притока крови к мозгу.
- Положить холод на место укуса (укола) для замедления всасывания аллергена.
- Дать антигистаминные препараты: фенкарол, супрастин, тавегил (по одной таблетке каждые 6 часов) для снижения аллергической дозы.
- Положить голову набок и выдвинуть нижнюю челюсть в целях предупреждения западания языка.
- Обеспечить проходимость дыхательных путей (достать из полости рта вставные зубы и протезы) в целях профилактики асфиксии.
- В зависимости от состояния пострадавшего вызвать скорую помощь или обратиться к врачу (фельдшеру) для оказания квалифицированной неотложной помощи.

Список литературы



- <https://www.12gdp.by/publikatsii/rasti-zdorovym/780-pervaya-pomoshch-pri-allergicheskikh-reaktsiyakh>
- <https://cyberleninka.ru/article/n/otek-kvinke-neobychnoe-techenie-sindroma/viewer>
- <https://cyberleninka.ru/article/n/krapivnitsa-sindrom-ilinozologicheskaya-edinitsa-krapivnitsa-sovremennyye-dannye-o-patogeneze-klassifikatsii-i-terapii/viewer>
- <http://www.studmedlib.ru/ru/doc/970409039V0021-0001/000.html?SSr=470134641920733fbda457cvaleriya-dim>
- <http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970446553-0017.html?SSr=470134641920733fbda457cvaleriya-dim>

Спасибо за внимание!

