

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России

# Аллергические реакции и доврачебная помощь при их возникновении



**РАБОТУ ВЫПОЛНИЛА:  
СТУДЕНТКА 108 ГРУППЫ  
ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА  
ДИМОВА ВАЛЕРИЯ ПАВЛОВНА**

Тверь  
2021



Термин «аллергия» –  
1906 г. ввел  
австрийский педиатр  
К. Пирке.

Аллергические  
реакции - реакции  
гиперчувствительност  
и иммунной системы,  
не имеющие  
защитного значения  
для организма и  
развивающиеся в  
ответ на воздействие  
антигенов,  
называемых  
аллергенами.



# Аллергены



укусы насекомых



употребление в пищу некоторых продуктов




индивидуальная непереносимость лекарственных средств и т.п.

- Аллергические реакции
  - Крапивница
- Ангioneвротический отёк (отёк Квинке)
- Анафилактический шок

## Крапивница

Крапивница характеризуется появлением зудящей, эритематозной сыпи, элементы которой возвышаются над поверхностью кожи. Первичным элементом при крапивнице является волдырь.





## Ангионевротический отёк (отёк Квинке)

Отек Квинке — острое состояние, характеризующееся возникновением отеков кожи и слизистых оболочек, реже внутренних органов и мозговых оболочек.



# Анафилактический шок

Анафилактический шок - острая системная аллергическая реакция на повторный контакт с аллергеном, угрожающая жизни и сопровождающаяся выраженными гемодинамическими нарушениями, а также нарушением функций других органов и систем.



# Доврачебная помощь



- Прекратить введение аллергена.
- Придать больному горизонтальное положение и приподнять ноги вверх для улучшения притока крови к мозгу.
- Положить холод на место укуса (укола) для замедления всасывания аллергена.
- Дать антигистаминные препараты: фенкарол, супрастин, тавегил (по одной таблетке каждые 6 часов) для снижения аллергической дозы.
- Положить голову набок и выдвинуть нижнюю челюсть в целях предупреждения западания языка.
- Обеспечить проходимость дыхательных путей (достать из полости рта вставные зубы и протезы) в целях профилактики асфиксии.
- В зависимости от состояния пострадавшего вызвать скорую помощь или обратиться к врачу (фельдшеру) для оказания квалифицированной неотложной помощи.



# Список литературы



- <https://www.12gdp.by/publikatsii/rasti-zdorovym/780-pervaya-pomoshch-pri-allergicheskikh-reaktsiyakh>
- <https://cyberleninka.ru/article/n/otek-kvinke-neobychnoe-techenie-sindroma/viewer>
- <https://cyberleninka.ru/article/n/krapivnitsa-sindrom-ilinozologicheskaya-edinitsa-krapivnitsa-sovremennyye-dannye-o-patogeneze-klassifikatsii-i-terapii/viewer>
- <http://www.studmedlib.ru/ru/doc/970409039V0021-0001/000.html?SSr=470134641920733fbda457cvaleriya-dim>
- <http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970446553-0017.html?SSr=470134641920733fbda457cvaleriya-dim>

Спасибо за внимание!

