




# ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3

Выполнила студентка 2 курса, сурдо: Семенова  
Елизавета Романовна

# Психопатологическая семиотика



■ Семиотика - учение о признаках болезней (симптомах) и характерных их сочетаниях (синдромах).

■ Семиотику психических расстройств часто называют общей (описательной) психопатологией (в отличие от частной, изучающей конкретные болезни, и «объясняющей» психопатологии — психологических концепций формирования тех или иных психических расстройств, используемых в разных психотерапевтических подходах).

# Психопатологическая синдромология

■ **Психопатологический синдром** (иногда называемый психопатологическим симптомокомплексом) — повторяющаяся совокупность симптомов, объединённых единством патогенеза, общими механизмами происхождения и характеризующих текущее состояние лица с психическим расстройством.


Все психопатологические симптомы можно разделить на **две группы**:

■ **Позитивные** (продуктивные, плюс-симптомы) — те симптомы, которые отсутствуют у здорового человека, но появляются у больного в результате болезни (например, галлюцинации, бред, тревога и пр.).

■ **Негативные** (минус-симптомы, дефект) — уменьшение или выпадение психических функций, имеющих у здоровых (например, амнезия, деменция, апатия и пр.).




## Позитивные симптомы



Зверева М.В.

## Негативные симптомы



# Первая помощь при Эпилепсии

- Уложить на ровную, желательно мягкую поверхность. Это, чтоб обезопасить от случайных травм во время неадекватного состояния.
- Расстегнуть верхние пуговицы, освободить от стягивающей одежды. Она может душить, опасно ограничивать его движения.
- Попробуйте повернуть голову пациента вправо или влево, чтобы не дать захлебнуться слюной, возможными рвотными массами.
- Все предметы, находящиеся в поле досягаемости для упавшего, необходимо отодвинуть. Человек не отдает себе отчет в том, что делает его тело. И может схватить что-нибудь, нанести себе или окружающим травму.
- В ротовую полость вставляем только мягкие предметы, не пытайтесь дать попить, скормить таблетку. Просто переждите опасное время, позвонив в скорую. После, когда все завершится и настанет сон, обеспечьте покой.
- Попробуйте осторожно, мягким валиком (из галстука, платка) разомкнуть челюсти. Но не пальцами. Судороги могут быть настолько сильными, что ломаются зубы. Открывая рот, мы избегаем этой опасности.
- После того, как опасность минует и эпилептик придет в себя, ему сразу нужно принять лекарство. Это поможет предотвратить повторные припадки



# ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ


## Первая помощь при приступе эпилепсии




**МЯГКОЕ ПОД ГОЛОВУ**



**РАЗВЯЖИТЕ ГАЛСТУК**



**НАКЛОНИТЕ НА БОК**



**ЗАФИКСИРУЙТЕ  
ВРЕМЯ ПРИПАДКА**



**В РОТ НИЧЕГО НЕ  
ВСТАВЛЯТЬ**



**НЕ ДАВИТЬ**



**... ПОСЛЕ ПРИСТУПА ...**



**... ПРЕДЛОЖИТЬ  
ПОМОЩЬ**



**СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ!**