




# Факторы риска атеросклероза



# Атеросклероз и Дислиппротеинемии








# Атеросклероз и ожирение




# Атеросклероз и курение

- Риск развития сердечно-сосудистых осложнений у курящих людей в 3 раза выше, чем у некурящих лиц. Данный риск продемонстрирован большинством современных исследований. Они доказали, что курение приводит к значительной дисфункции эндотелия, что является пусковым механизмом в развитии атеросклероза. Вдобавок к этому курение стимулирует тромбообразование и повышает вязкость крови. Это приводит к частым формированиям тромбов и закупорке сосудов, что осложняет течение атеросклероза.



# Атеросклероз и Артериальная гипертензия

- Связь между повышенным артериальным давлением и атеросклерозом была доказана в ряде исследований. Согласно этим исследованиям артериальная гипертензия сопровождается структурными изменениями в сосудистой стенке и дисфункцией самого эпителия. Имеет место десквамация (расслаивание) эпителия сосудистой стенки и нарушение его проницаемости. Это создает почву для быстрого пропитывания сосудистой стенки липидами и формирования атеросклеротической бляшки.



# Сахарный диабет и атеросклероз

- Сахарный диабет сочетается не только с высоким риском атеросклероза, но и с тяжелой степенью его течения. Известно, что риск развития сердечно-сосудистых осложнений при атеросклерозе у мужчин с сахарным диабетом возрастает в 5 раз, а у женщин – в 7 раз. Данный риск возрастает в несколько раз, если мужчина или женщина курит или страдает избыточным весом.

