



RU1508370191

Кетонал®/Ортанол® Кетонал® - Контроль над болью и воспалением с первых минут приема^{1*}

Презентация для аптечных учреждений

Материал предназначен для фармацевтических работников

ЛСП-008841/08, П№013942/01, П№013942/06, П№013942/03, П№013942/04ЛСП-007825/08

^{1*}при использовании препарата Кетонал® раствор для в/в и в/м введения

Боль – самый распространенный синдром



Травмы



Боль в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника (Остеохондроз, Радикулит)



Воспаления суставов



Болезненные менструации



Зубная боль



Головная боль

Кетонал®


Контроль над болью и воспалением с первых минут приема¹



- Быстрое избавление от боли¹
- Суточный контроль²
- Отсутствие ограничения по длительности приема²

Кетонал®

Основные преимущества молекулы кетопрофена



Выраженный анальгетический и противовоспалительный эффект

Короткий период полувыведения < 2х часов - меньше нежелательных явлений

Маленькая липофильная молекула – центральное и периферическое действие

Благоприятный профиль переносимости

Портрет покупателя

Препарат Кетонал®



Портрет покупателя НПВП

Портрет покупателя

Покупатель с болевым синдромом, которому врач выписал НПВП

Свойство	Преимущество	Выгода
Скорость действия Кетонал® амп. начинается уже через 8-12 мин после первого введения ¹ , Кетонал® 100 мг таблетки – через 25 мин (по сравнению с мелоксикамами, лорноксикамом) ³	Помогает избавиться от боли с первых минут приема Надежность терапии	Увеличение числа постоянных покупателей
Высокий профиль безопасности у всех форм Кетонала (по сравнению с кеторолаками, ацеклофенаком, нимесулидами, мелоксикамами)*	Минимальный риск возникновения побочных эффектов*	Повышает удовлетворенность Ваших клиентов
Пролонгированное действие Кетонал® ДУО (по сравнению с пероральными формами нимесулидов, декскетопрофена, ацеклофенака, кеторолака, прием которых 2-6 раз/день) ²	Надежность терапии	Увеличение числа постоянных покупателей
Кетонал® - Швейцарский подход к качеству от компании Сандоз Находится в средней ценовой категории	Оптимальное соотношение цена/качество	Увеличение товарооборота аптеки
Многообразие форм в рамках МНН (8 лекарственных форм)	Возможность выбора ЛФ в зависимости от интенсивности боли и индивидуальных особенностей потребителя. Возможность совместного предложения (при травме, боли в спине, шее) Кетонал® таб. и Кетонал® крем или Кетонал® инъекции/таб/крем в рамках рецепта.	Увеличение числа покупателей Увеличение товарооборота аптеки и среднего чека

*Лазебник Л.Б., Дроздов В.Н., Коломиец Е.В. Эффективность кетопрофена и мелоксикама у больных остеоартрозом. Русский медицинский журнал, 2005.-N 15.-С.1006-1008. Лазебник Л.Б., Дроздов В.Н., Коломиец Е.В. Сравнительная эффективность и безопасность применения кетопрофена, лорноксикама, нимесулида и целекоксиба у больных остеоартрозом. Русский медицинский журнал, 2004.-N 14.-С.844-847

Кетонал® – скорость наступления эффекта - 8 – 12 минут¹

Ступенчатая терапия острой выраженной боли



1-2 ампулы в день



1 – 2 раза/день

Кетонал® – суточный контроль при 1-кратном приеме²

Острая боль



1 капсула - 1 раз/день



1 таблетка - 1 раз/день

Кетонал® – выраженный локальный эффект^{4,5}




*при использовании препарата Кетонал® раствор для в/в и в/м введения

Кетонал® – контроль над болью и воспалением с первых минут приема¹

Острая боль

Совместное применение системной и местной форм позволяет обеспечить эффективное обезболивающее и противовоспалительное действие^{4, 5}



1 – 2 раза/день

*при использовании препарата Кетонал® раствор для в/в и в/м введения



**СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ РОССИИ**
RUSSIAN DENTAL ASSOCIATION

**КЕТОНАЛ® -
единственный НПВП,
которому присвоен
«ЗНАК ОДОБРЕНИЯ»
Стоматологическая
ассоциация России***



П№013942/06

*Свидетельство №0200, выдано ЗАО «Сандоз», от 23.04.2013г.

Ортанол® – надежная защита ЖКТ на 24 ч при 1-кратном приеме*



- Особая технология двойной защиты омепразола
- Надежно защищает слизистую ЖКТ в течение 24 ч на фоне приема НПВП*

ЛСР-007825/08



*Sharma B K, Walt RP, Pounder RE, et al: Optimal dose of oral omeprazole for maximal 24 hour decrease of intragastric acidity. Gut 1984a; 25:957-964.


Кто пришёл в аптеку?



Типы покупателей в аптеке

- **Темперамент** - это врожденные психологические черты, которые передаются у нас по наследству.
- Важно определять **темперамент покупателя** для построения своей линии поведения.
- Классификация темперамента идет еще от Гиппократ и составляет 4 типа:

Флегматик




Сангвиник

Холерик

Меланхолик

Темперамент покупателя: **флегматик**



- **Недопустимо в общении:**

Ждать от него креативности, гибкости поведения.

- **Как строить общение:**

Не торопить его в совершении покупки, дать ему "пищу" для размышления.

Кетонал® - Известный надежный бренд с доказанным быстрым обезболивающим эффектом³

Темперамент покупателя: **холерик**



- **Недопустимо в общении:**


Критиковать, повышать голос, ждать от него обдуманных и взвешенных решений, обижаться на его резкость, прямолинейность в общении, несдержанность с Вашей стороны.

- **Как строить общение:**

Необходимо использовать его лидерские качества, желание везде быть первым. Придерживаться в общении спокойного, делового тона.

Кетонал® ДУО – Инновационный подход для контроля боли и воспаления с первых минут приема²

Темперамент покупателя: **сангвиник**



- **Недопустимо в общении:**

Стремление глубоко разобраться в вопросе, который ему не интересен.

- **Как строить общение:**

Поддерживать его интерес, использовать его умение общаться.

Кетонал® - контроль над болью и воспалением с первых минут приема для быстрого возвращения к активной жизни¹

Темперамент покупателя: **меланхолик**



- **Недопустимо в общении:**

Критиковать, повышать голос, принуждать к чему либо, если он психологически не готов, ждать от него инициативы, активности, общительности.

- **Как строить общение:**

Поддерживать его в решении, хвалить, делать комплементы, общаться спокойным и ровным ТОНОМ.

Кетонал® - Правильный выбор для контроля боли и воспаления с первых минут приема¹

Сила голоса



Сила голоса

Первостольник должен говорить громко, так как громкий голос вызывает больше доверия у потенциального покупателя

- Сила голоса, его высота и тембр могут воздействовать на собеседника.
- Первостольник является консультантом покупателя по многим вопросам и поэтому его голос и тон речи должны вызывать доверие, авторитет и располагать покупателя к себе.



Высокий голос

- Производит впечатление юности
- Владелец высокого голоса всегда кажется молодым, полным сил и энергии
- Из-за высокого голоса человек не кажется окружающим его людям зрелым
- У человека звонкий и высокий голос подсознательно связывается с опасностью
- Высокий голос вызывает дискомфорт



Низкий голос

- Вызывает чувство уверенности в себе, самодостаточности и интеллекта
- Если первостольник обладает низким голосом, то покупатели будут воспринимать его как авторитетного, квалифицированного специалиста

Низкий голос =

уверенный первостольник!

Кетонал®- контроль над болью и воспалением с первых минут приема¹

*при использовании препарата Кетонал® раствор для в/в и в/м введения



Однотонный, монотонный голос

- Влияет на покупателя и собеседника как хорошее снотворное
- Внимание и концентрация собеседника рассеивается, и говорить с таким человеком очень тяжело
- То, что говорит первостольник, будет восприниматься неадекватно



Краткая инструкция по препарату Кетонал®

ЛСР-008841/08, П№013942/01, П№013942/06, П№013942/03, П№013942/04

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Кетонал®, Кетонал® ДУО, Кетонал крем®, Кетонал гель®

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: кетопрофен.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: Симптоматическая терапия болезненных и воспалительных процессов различного происхождения, в том числе: воспалительные и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата: ревматоидный артрит; ревматоидный периартрит; серонегативные артриты: анкилозирующий спондилоартрит – болезнь Бехтерева, псориатический артрит, реактивный артрит (синдром Рейтера); подагра², псевдоподагра²; остеоартроз; болевой синдром: слабый, умеренный и выраженный при головной боли³, мигрени⁴, тендините, бурсите, миалгии, невралгии, радикулите, посттравматический болевой синдром, послеоперационный болевой синдром², посттравматический и послеоперационный болевой синдром, сопровождающийся воспалением и повышением температуры⁴; болевой синдром при онкологических заболеваниях²; альгодисменорея⁵, воспалительные процессы органов малого таза, в том числе андексит⁴; зубная боль⁶

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Зависит от формы выпуска и способа введения. Для снижения частоты нежелательных реакций рекомендуется использовать минимальную эффективную дозу препарата. Максимальная суточная доза составляет 200 мг.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Гиперчувствительность к кетопрофену или другим компонентам препарата, а также салицилатам или другим нестероидным противовоспалительным препаратам; полное и неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза слизистой оболочки носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) (в том числе в анамнезе); язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки в стадии обострения², язвенный колит², болезнь Крона в фазе обострения², воспалительные заболевания кишечника в стадии обострения²; гемофилия и другие нарушения свертываемости крови²; детский возраст (до 15 лет); тяжелая печеночная недостаточность²; тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина (КК) менее 30 мл/мин)², прогрессирующие заболевания почек²; некомпенсированная сердечная недостаточность²; послеоперационный период после аортокоронарного шунтирования²; желудочно-кишечные, цереброваскулярные и другие кровотечения (или подозрение на кровотечение)²; хроническая диспепсия²; III триместр беременности; дивертикулит⁶; период лактации², дефицит лактазы⁶, непереносимость лактозы⁶, глюкозо-галактозная мальабсорбция⁶; подтвержденная гиперкалиемия⁸. Для Кетонал® крем/гель также: Гиперчувствительность к тиапрофеновой кислоте, фенофибрату, блокаторам УФ-лучей, отдушкам; указание в анамнезе на приступы бронхиальной астмы после применения НПВП и салицилатов; нарушение целостности кожных покровов (экзема, мокнущий дерматит, открытая или инфицированная рана), реакции фоточувствительности в анамнезе, воздействие солнечного света в том числе непрямыми солнечными лучами и ультрафиолетовое облучение в солярии на протяжении всего периода лечения и еще 2-х недель после прекращения лечения препаратом.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ: Кетонал® крем/гель: Нарушение функции печени и/или почек, эрозивно-язвенное поражение желудочно-кишечного тракта, заболевания крови, бронхиальная астма, хроническая сердечная недостаточность. Кетонал® ДУО: бронхиальная астма в анамнезе; клинически выраженные сердечно-сосудистые заболевания; дислипидемия; прогрессирующие заболевания печени, гипербилирубинемия, алкогольный цирроз печени; почечная недостаточность (КК 30 - 60 мл/мин); хроническая сердечная недостаточность; артериальная гипертензия; заболевания крови, дегидратация; сахарный диабет; анамnestические данные о развитии язвенного поражения желудочно-кишечного тракта; курение; сопутствующая терапия антикоагулянтами, антиагрегантами, глюкокортикостероидами, селективными ингибиторами обратного захвата серотонина; длительное применение НПВП; наличие инфекции *Helicobacter pylori*; печеночная недостаточность, пожилой возраст.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ: Кетонал® крем/гель: может быть использован в первом и втором триместрах беременности после консультации с врачом, если ожидаемая польза для матери превосходит возможный риск для плода. Применение Кетонал® крем/гель во время грудного вскармливания не рекомендуется. Кетонал® ДУО: Назначать препарат беременным женщинам в I и II триместрах беременности возможно только в случае, когда преимущества для матери оправдывают возможный риск для плода. На сегодняшний момент отсутствуют данные о выделении кетопрофена в грудное молоко, поэтому при необходимости назначения кетопрофена кормящей матери, следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: бессонница, депрессия, астения (только для ампул); тошнота, рвота, диспепсия, боль в животе, НПВП-гастропатия. Для Кетонал® крем/гель: зрительная, зуд, жжение, экзема, транзиторный дерматит легкой степени тяжести.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Кетонал® крем/гель: Необходимо избегать попадания геля в глаза, на кожу вокруг глаз, слизистые оболочки. При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Если Вы забыли нанести гель, нанесите его в то время, когда должна быть нанесена следующая доза, но не удваивайте ее. Не применять в виде окклюзионных повязок. Кетонал® ДУО: Не следует сочетать прием кетопрофена с приемом других НПВП и/или ингибиторов ЦОГ2. При длительном применении НПВП необходимо периодически оценивать клинический анализ крови, контролировать функцию почек и печени, в особенности, у пациентов пожилого возраста (старше 65 лет), проводить анализ кала на скрытую кровь. При возникновении нарушений со стороны органов зрения лечение следует незамедлительно прекратить. Использование препарата должно быть прекращено перед большим хирургическим вмешательством. При управлении транспортными средствами и занятиях другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, необходимо соблюдать осторожность.

¹ для Кетонал® крем/гель, ² для инъекций и пероральных форм Кетонал®, ³ для Кетонал® раствор для инъекций, Кетонал® таб 100 мг,

⁴ для Кетонал® раствор для инъекций, ⁵ для Кетонал® ДУО, Кетонал® раствор для инъекций, Кетонал® таб 100 мг ,

⁶ для Кетонал® таб 100мг, ⁷ для Кетонал® таб 100 мг, Кетонал® ДУО,

⁸ для Кетонал® таб 100 мг, Кетонал® раствор для инъекций

Краткая инструкция по препарату Ортанол®

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: Ортанол®

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ: омепразол. **ФОРМА ВЫПУСКА:** капсулы 20 и 40 мг.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в т.ч. профилактика рецидивов). Эрадикация *Helicobacter pylori* у инфицированных больных с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки (в составе комбинированной терапии). Рефлюкс-эзофагит. Гиперсекреторные состояния (синдром Золлингера-Эллисона, полиэндокринный аденоматоз, системный мастоцитоз, стрессовые язвы желудочно-кишечного тракта). Профилактика и лечение повреждений слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, обусловленных приемом НПВС (диспепсия, эрозии слизистой оболочки, пептическая язва). Диспепсия, связанная с повышенной кислотностью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к омепразолу или другим компонентам препарата. Редкие наследственные формы непереносимости лактозы, дефицит лактазы, сахаразы/изомальтазы или нарушение всасывания глюкозы/галактозы (т.к. в составе содержится лактоза); одновременное применение с нелфинавиrom, эрлотинибом и позаконазолом; дети младше 2-х лет и с массой тела менее 20 кг (при лечении рефлюкса-эзофагита, симптоматическом лечении изжоги и отрыжки кислым при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни); дети младше 4 лет (или с массой тела менее 31 кг) (при лечении язвы 12-перстной кишки, вызванной *Helicobacter pylori*).

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ: Применение омепразола у беременных женщин не оказывает отрицательного влияния на течение беременности и здоровье плода/новорожденного. Препарат Ортанол® может применяться во время беременности.

Омепразол проникает в грудное молоко, однако при применении его в терапевтических дозах воздействие на ребенка маловероятно.

Препарат Ортанол® может применяться в период грудного вскармливания.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: Тошнота, рвота, боль в животе, диарея или запор, метеоризм, головная боль.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: Перед началом терапии омепразолом необходимо исключить наличие злокачественного процесса. Суточная доза у пациентов с нарушением функции печени суточная доза не должна превышать 20 мг. У пациентов с нарушением функции почек и у пожилых пациентов (старше 65 лет) коррекция дозы не требуется.

ЛСР-007825/08



СПАСИБО!

ПЕРЕД НАЗНАЧЕНИЕМ ПРЕПАРАТА, ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПОЛНОЙ ИНСТРУКЦИЕЙ

ЛИТЕРАТУРА:

1. Скорость наступления эффекта - 8 – 12 минут для препарата Кетонал® р-р для в/м, в/в. Пиковский В.Ю. и др. Применение нестероидного противовоспалительного препарата Кетонал (кетопрофен) в условиях догоспитального этапа, 2004; Вестник интенсивной терапии; 2: 44-45
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Кетонал® ДУО и Кетонал® 150 мг.
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Кетонал® 100 мг.
4. L. Mason et al., Topical NSAIDs for acute pain: a meta-analysis, BMC Family Practice 2004, 5:10; Cochrane Database Syst Rev. 2010; (6): CD007402.
5. T. Komatsu et al., Comparison of the efficacy and skin permeability of topical NSAID preparations 3 used in Europe, Eur. J. Pharm. Sci. (2012)

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.72, корп.3,
ЗАО «Сандоз», тел.: +7 (495) 660-75-09
www.sandoz.ru

 **SANDOZ**
a Novartis company