



ИППП сегодня!

- ежедневно более 1 млн человек приобретают ИППП



ИППП
являются
основной
причиной
бесплодия как
у мужчин, так
и у женщин



При
отсутствии
лечения
ИППП могут
иметь
серьезные
последствия
для здоровья
матери и
ребенка

Пути передачи ИППП

- инфицирование через половой контакт
- контактно-бытовой способ
- парентеральный путь передачи (через кровь)
- внутриутробное заражение

Первые симптомы после незащищенного полового акта проявляются не так скоро!

ВИЧ/СПИД

Спустя месяцы или даже многие годы.

Неизлечим



СИФИЛИС

1-12 недель - Поражает сердце, мозг, вызывает слепоту и невынашивание беременности.



ГЕПАТИТЫ В и С

1-9 месяцев

Причина рака печени



ГОНОРЕЯ

2-21 день или бессимптомно - Поражает кожу, сердце, суставы, вызывает слепоту.



ТРИХОМОНИАЗ

5-28 дней или бессимптомно. Преждевременные роды.



ХЛАМИДИОЗ

2-7 дней или бессимптомно. Поражает суставы, одна из главных причин женского бесплодия.



ВПЧ/ГЕНИТАЛЬНЫЕ БОРОДАВКИ

Недели и месяцы или бессимптомно. Причина рака шейки матки.



ВИРУС ГЕРПЕСА

1-30 дней или бессимптомно. Неизлечим, но может контролироваться медикаментозно.



ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ. МИКОПЛАЗМОЗ. УРЕПЛАЗМОЗ

Чаще бессимптомно. Относятся к условно-патогенным возбудителям.



Важно отметить!

- При инфекциях, передаваемых половым путем не происходит самоизлечения организма.
- Если через некоторое время симптомы исчезают, то это является переходом в скрытую форму
- При обнаружении первых симптомов необходимо обратиться к врачу!

ВИЧ в России

Все возрастные группы
подвержены заражению



200

случаев заражения
ежедневно

Число смертельных
случаев возросло в

13 раз

40%

Случаев заражения
происходит половым
путем

Томская область занимает **1** место в
СФО по темпам распространения
ВИЧ-инфекции (**6,1** тыс. ВИЧ-
инфицированных)

Основные способы передачи ВИЧ

- Незащищенный половой акт
- Инъекции
- Переливание крови
- Ребенку от ВИЧ-инфицированной мамы

На сегодняшний день вакцина или прививка, которые защищали бы от ВИЧ инфекции не созданы! Чтобы защитить себя от заражения, важно соблюдать простые правила:

- Использовать презерватив при каждом половом контакте
- Никогда не употреблять инъекционные наркотики