


Марсупиализация, основные аспекты проведения (создание искусственного соустья между слизистой оболочкой бартолиновой железы и кожей)

Подготовила
студентка 3 курса 14 группы
1 лечебного факультета
Смолякова Янина Александровна

Бартолиновы железы (большие вестибулярные)



Бартолинит



Киста бартолиновой железы

Наружные признаки воспаления бартолиновой железы



- Клитор
- Наружное отверстие мочеиспускательного канала
- Бартолиновая железа и ее проток
- Киста бартолиновой железы



- Киста бартолиновой железы



Причины возникновения

ЗППП (гонорея, хламидиоз и др.)

/словно-патогенная флора (стафилококки, кишечная палочка и тд)

Механическая провокация (эпиляция зоны глубокого бикини)

Гинекологические манипуляции (аборт, гистероскопия)

Марсупиализация

Предоперационные Анализы

клинический анализ
крови;

кровь на резус-фактор

лабораторный анализ
мочи;

анализ на уровень
глюкозы в крови

кровь на ВИЧ-
инфекции, сифилис,
гепатит

мазок на микрофлору
влагалища


Послеоперационный период

Не рекомендовано:

**1. Физ нагрузки 2
недели**

**2. Половая жизнь
месяц**

**Осмотр врача через
полтора-два месяца**



**БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ**