**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РГГМУ)**

**КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЙ И СИСТЕМНОЙ ЭКОЛОГИИ**

ДОКЛАД
на тему «Приспособление животных к экстремальным значениям солёности»

Выполнил: Григорьев К.О.
Группа: Э-Б19-1-8

2021

# Солёность

- Соленость - есть суммарное содержание в граммах всех твердых минеральных растворимых веществ, содержащихся в 1 кг морской воды

# Организмы и галинные воды

- Организмы, заселяющие галинные воды делятся на три экологические группы:
- Галоксены
- Галофилы
- Галобионты

Рис. 1 - Artemia salina

Рис. 2 - Baeotendipes noctivagus

# Список использованной литературы:


- Статья из журнала «Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems».
- З.Г. Гольд, В.М. Гольд «Общая гидробиология». – Красноярск, СФУ, 2003.