

В
И
Ч

ВИРУС

ИММУНОДЕФИЦИТА

ЧЕЛОВЕКА

С
П
И
Д

СИНДРОМ

ПРИБРЕТЕННОГО

ИММУНО

ДЕФИЦИТА

СПИД – КОНЕЧНАЯ СТАДИЯ ВИЧ - инфекции

ЛЕКАРСТВА ОТ СПИДА НЕТ!!!



Страшная статистика

Во всем мире

- Каждый год инфицируются 16 тысяч человек
- 34 миллиона 200 тысяч человек – инфицированы ВИЧ
- 1 миллион 200 тысяч – уже умерли от СПИДа





1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом



ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ



У наркоманов при использовании одного шприца.



При переливании инфицированной крови или через загрязненные кровью инструменты при инъекциях.



При нанесении татуировок, прокалывании пирсинга загрязненными инструментами.



При сексуальных контактах, если один из партнеров инфицирован.



От ВИЧ-инфицированной матери ребёнку во время родов, кормления грудью.

ВИЧ – инфекция не передается



ЧЕРЕЗ СТОЛОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ОБЩИМ ТУАЛЕТОМ



ПРИ СОВМЕСТНОМ
КУПАНИИ В БАССЕЙНЕ

БЕЗОПАСНО:

ДОНОРСТВО,

ПОСЕЩЕНИЕ
ПОЛИКЛИНИК,
БОЛЬНИЦ

ПРИ РУКОПОЖАТИИ

ПРИ ПОЦЕЛУЕ



ЧЕРЕЗ СЛЕЗЫ,
СЛЮНУ И ПРИ
ЧИХАНИИ И КАШЛЕ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ
НАСЕКОМЫХ

ЧЕРЕЗ УКУСЫ
ЖИВОТНЫХ



ПОМНИТЕ!

- ⦿ Заразиться ВИЧ-инфекцией и СПИД может **любой** человек, не выполняющий основные правила безопасности в отношении ВИЧ-инфекции!
- ⦿ Защита заражения от ВИЧ-инфекции зависит чаще всего **от вас!**



Меры предупреждения заражению

- ◎ Соблюдение общепринятых правил личной гигиены
- ◎ Безопасное сексуальное поведение
- ◎ Соблюдение стерильности при проведении любых медицинских и косметических процедур



«Давайте будем жить все трезво,
Здоровьем нашим дорожа.
Не занимайтесь рано сексом,
Курить бросайте навсегда.
Хотим смотреть в лицо судьбе мы,
Чтоб не кидать всё «на авось»,
Шагать по жизни твердо, смело,
О чём мечтаем, чтоб сбылось.»

Работы ваших сверстников



ОСТОРОЖНО!!! СПИД

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека. ВИЧ поражает защитную систему организма - человек становится ВИЧ-инфицированным. **Носители ВИЧ** могут даже не подозревать, что инфицированы, и передать вирус другим людям практически сразу с момента инфицирования. Большинство людей - носителей ВИЧ **выглядят здоровыми и чувствуют себя хорошо** в течение продолжительного времени после заражения (иногда до 10 лет). СПИД является следствием воздействия ВИЧ на организм человека. СПИД развивается у людей с ВИЧ, когда иммунная система разрушена.

Обнаружить ВИЧ в организме можно примерно **через 3-6 месяцев** после заражения только с помощью специального анализа крови.

ВИЧ может передаваться только тремя путями:

- 1. Половым:** при случайных контактах без презерватива, через слюну и влагалищные выделения.
- 2. Через кровь:** при попадании в организм инфицированной крови при использовании нестерильных игл и шприцев при введении наркотиков, нестерильных инструментов для пирсинга и татуажа, при совместном с ВИЧ-инфицированным использовании бритв и бритвенных лезвий.
- 3. От матери к ребенку:** во время беременности, при прохождении через родовые пути, при кормлении грудью.

Принято считать СПИД болезнью социальной, ее распространение определяется отношениями между людьми в обществе.

ВИЧ не передается:

- Через слезы, спину, пот, мочу, при кашле;
- Через укусы насекомых;
- Через бытовые предметы, посуду, одежду, пищу;
- При пользовании общим туалетом, баней, душем, бассейном;
- В транспорте, при рукопожатии, разговоре.

В России в настоящее время стандартной процедурой лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции является обнаружение антител к ВИЧ с последующим подтверждением их в реакции иммунного блоттинга.



