

Гуморальная регуляции организма

Эндокринная система – совокупность эндокринных желез (внутренней секреции)

Управление помощью гормонов, которые действуют на органы «мишени»


Железы делятся:

1. Центральные (гипоталамус, гипофиз, эпифиз)
2. Периферические

Гормоны по химическому составу бывают:

- Аминокислоты и их производные (Тироксин, адреналин)
- Белки или полипептиды (Инсулин, гормоны гипофиза)
- Стероиды (половые гормоны и г.коры надпочечников)

Центральные (гипоталамус, гипофиз, эпифиз)



Работа **гипоталамуса** стимулируется НС

Гипоталамус выделяет гормоны:
Либерины (активация работы *Гипофиза*)
Статины (подавление *Г*)

Гипофиз

Передняя доля г.:

АКТГ (адренокортикотропный гормон)

–

регулирует кору надпочечников

Тиреотропный г – щитовидную железу

Соматотропный (гормон роста)

Задняя доля г.:

Вазопресин (обратное всасывание воды в почках)

Окситоцин (сокращение матки)

Периферические


Гипофиз-зависимые

Периферические эндокринные железы

Щитовидная железа


Щитовидная железа секретирует 3 гормона:

- **Тироксин:** Усиливает процессы окисления жиров, углеводов и белков в клетках, ускоряя, таким образом, обмен веществ в организме. Повышает возбудимость центральной нервной системы.
- **Трийодтиронин:** Действие во многом аналогично тироксину.
- **Тирокальцитонин:** Регулирует обмен кальция в организме, снижая его содержание в крови, и увеличивая его содержание в костной ткани. Снижение уровня кальция в крови уменьшает возбудимость центральной нервной системы.



От нормальной функции щитовидной железы зависят такие основные биологические процессы, как рост, развитие и дифференцировка тканей.

Половые железы



- Эндокринной функцией в яичке обладает интерстиций, в котором располагаются клетки Лейдига.
- В яичниках эндокринной функцией обладает зернистый слой созревающих фолликул, а также интерстициальные клетки яичника.

Половые железы



Надпочечники

Маленькие уплощенные парные железы желтоватого цвета.


Состоят из:

- внешнего (коркового) и
- внутреннего (мозгового) слоев.

Правый и левый надпочечники различаются по форме: правый треугольный, а левый в форме полумесяца.

Корковое вещество включает:

- клубочковую
- пучковую и
- сетчатую зоны.



Корковое в-во

гипофиз зависимые

Минералокортикостероиды (обмен Na^+ K^+)

Глюкокортикостероиды (углеводов, белков)

Мозговое

вещество:

Гипофиз независимые

Адреналин и норадреналин

Гипофиз независимые

* Паращитовидные железы:

- * *(околощитовидные железы)*
- * — четыре небольших эндокринных железы, расположенные по задней поверхности щитовидной железы, попарно у её верхних и нижних полюсов.
- * Общая масса – 0,1–0,3 г.
- * Вырабатывают паратиреоидный паратгормон.



Паратгормон – регулирует содержание Ca

Поджелудочная железа


Гормоны

Инсулин

Глюкогон

Соматостатин





*вилочковая
железа (тимус)*

Тимус

секретирует гормон: тимозин.

- Он влияет на обмен углеводов, кальция*
- Регулирует рост скелета, участвует в управлении иммунными реакциями (увеличивает количество лимфоцитов в крови, усиливает реакции иммунитета) .*

Гормоны:
Тимозины
Тимопоэтины

Нейрогуморальная регуляция организма

Уровни регуляции:

1. Нейрогуморальная
2. Гормональная
3. Внутриклеточные (по средствам активации ферментов)

