Линейные неравенства с параметром

Определение:

Неравенства вида ***ax>b, ax<b, ax≥b, ax≤b***, где ***a*** и ***b*** – действительные числа или выражения, зависящие от параметров, а ***x*** – неизвестное, называются ***линейными неравенствами с параметром***.



Пример 1:

(m-1)x<5m

Решение:

m=1 – контрольное значение

$$0 \cdot x < 5 \quad \forall x \in R$$

$$m > 1 \qquad x < \frac{5m}{m-1}$$

$$m < 1 \qquad x > \frac{5m}{m-1}$$

Пример 2:

Решить неравенство при всех значениях параметра *a:*

a(3x-5)<6+ax

Решение:

Приведем к линейному виду:

3ax-5a<6+ax

2ax<6+5a

a=0 – контрольное значение

$$0 \cdot (3x - 5) < 6 \quad \forall x \in R$$

$$a > 0 \quad x < \frac{6 + 5a}{2a}$$

$$a < 0 \quad x > \frac{6 + 5a}{2a}$$

Пример 3:

Чему равно значение переменной при различных значениях параметра:

$$b^2x - x + 1 > b$$

Решение:

Приведем к линейному виду:

$$b^2x - x > b - 1$$

$$x(b^2 - 1) > b - 1$$

$$b = \pm 1 - \textit{контрольные значения}$$



$$\text{если } b \in (-\infty;-1), \text{ то } b^2-1>0 \qquad x>\frac{1}{b+1}$$

$$\text{если } b \in (-1;1), \text{ то } b^2-1<0 \qquad x<\frac{1}{b+1}$$

$$\text{если } b \in (1;+\infty), \text{ то } b^2-1>0 \qquad x>\frac{1}{b+1}$$

$$\text{если } b=-1, \text{ то } 0\cdot x>-2,\ x\in R$$

$$\text{если } b=1, \text{ то } 0\cdot x>0,\ x\in \varnothing$$

Пример 4:

Найти все значения переменной относительно параметра a: $\frac{3ax+4}{3a+9} < \frac{x}{a+3} + \frac{3a-5}{3a-9}$

Решение:

$a = \pm 3 -$ *контрольные значения*

если $a = \pm 3$ *неравенство не имеет смысла*

Приведем к линейному виду ax=b:

$$\frac{3ax+4}{3(a+3)} - \frac{x}{a+3} < \frac{3a-5}{3(a-3)}$$

$$\frac{3ax+4-3x}{3(a+3)} < \frac{3a-5}{3(a-3)}$$

$$\frac{3ax-3x}{3(a+3)} + \frac{4}{3(a+3)} < \frac{3a-5}{3(a-3)}$$

$$\frac{ax-x}{a+3} < \frac{(3a-5)(a+3)-4(a-3)}{3(a-3)(a+3)}$$

$$\frac{x(a-1)}{a+3} < \frac{3(a^2-1)}{3(a-3)(a+3)}$$

$a = 1 -$ *контрольное значение*



$$\text{если } a \in (-\infty;-3), \text{ то } \frac{a-1}{a+3} > 0 \qquad x > \frac{a+1}{a-3}$$

$$\text{если } a = \pm 3, \text{ то } x \in \varnothing$$

$$\text{если } a \in (-3;1), \text{ то } \frac{a-1}{a+3} < 0 \qquad x > \frac{a+1}{a-3}$$

$$\text{если } a = 1, \text{ то } 0 \cdot x < 0, \; x \in \varnothing$$

$$\text{если } a \in (1;3), \text{ то } \frac{a-1}{a+3} > 0 \qquad x < \frac{a+1}{a-3}$$

$$\text{если } a \in (3;+\infty), \text{ то } \frac{a-1}{a+3} > 0 \qquad x < \frac{a+1}{a-3}$$

Пример 5:

Решить неравенство: $a|x| > 2$

Решение:

$a = 0 -$ *контрольное значение*



$$\text{если } a < 0, \text{ то } |x| < \frac{2}{a} \ (\text{модуль} < \text{отрицательного числа}); \ x \in \varnothing$$

$$\text{если } a = 0, \text{ то } 0 \cdot |x| > 2; \ x \in \varnothing$$

$$\text{если } a > 0, \text{ то } |x| < \frac{2}{a} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x > \dfrac{2}{a} \\ x < -\dfrac{2}{a} \end{array} \right.$$

Пример 6:

При каких значениях k неравенство

$$(k-1)x+2k+1>0 \quad (1)$$

верно при всех значениях x, удовлетворяющих условию $|x|\leq 3$?

Решение:

Введем в рассмотрение функцию $f(x)= (k-1)x+2k+1$

Она является линейной при любом действительном значении k, т.е. при любом действительном значении k графиком ее служит прямая.







Для выполнения неравенства (1) на всем отрезке [-3;3] достаточно выполнения условия

$$\begin{cases} f(-3) > 0 \\ f(3) > 0 \end{cases}$$

$$f(-3) = -3(k-1) + 2k + 1 = 4 - k$$

$$f(3) = 3(k-1) + 2k + 1 = 5k - 2$$

$$\begin{cases} f(-3) > 0 \\ f(3) > 0 \end{cases} \quad при \quad \begin{cases} 4 - k > 0 \\ 5k - 2 > 0 \end{cases} \Rightarrow 0{,}4 < k < 4$$