

## Глава 6. Интегрирование на подмножествах $R^n, n \geq 2$ .

### (Кратный интеграл)

Всюду в этой главе  $p, q \in N, n = p + q, x(x_1, x_2, \dots, x_p) \in R^p,$

$$y(y_1, y_2, \dots, y_q) \in R^q,$$

$A_n = L(R^n)$  – сигма-алгебра измеримых по Лебегу множеств в  $R^n,$

$A_p = L(R^p), A_q = L(R^q)$  – сигма-алгебры измеримых по Лебегу

множеств в  $R^p$  и  $R^q$  соответственно;

$\mu_n$  – мера Лебега в  $R^n, \mu_p, \mu_q$  – меры Лебега в  $R^p$  и  $R^q$ ;

$$R^n = R^p \times R^q.$$

Пусть  $C_0 \in A_n, C \subset C_0, C \in A_n$ ;

$f: C_0 \rightarrow R$  – измеримое отображение.

Если интеграл Лебега определен (конечный или бесконечный), будем обозначать его:

$$\int_C f d\mu_n \equiv \int_C f(x; y) d\mu_n(x, y) \equiv \int_C f(x; y) dx_1 \dots dx_p dy_1 \dots dy_q.$$

Если  $B_0 \in A_p$ ,  $B \subset B_0$ ,  $B \in A_p$ ,  $g: B_0 \rightarrow R$  – измеримо и определен интеграл Лебега от функции  $g$  по множеству  $B$ , будем обозначать его:

$$\int_C g d\mu_p \equiv \int_C g(x) d\mu_p(x) \equiv \int_B f(x) dx_1 \dots dx_p.$$

## §1. Сечения множеств в $R^n$ . Теорема о сечениях.

**Определение 1.** Пусть  $A \subset R^n, x \in R^p$ .

Множество  $A(x) = \{y \in R^q : (x, y) \in A\}$  называется сечением множества  $A$  по точке  $x$ ,  $A(x) \subset R^q$ .

Аналогично, для  $y \in R^q$  множество  $A(y) = \{x \in R^p : (x, y) \in A\} \subset R^p$  называется сечением множества  $A$  по точке  $y$ .

**Примеры** приведем на лекции.

**Замечание 1.** Сечения  $A(x)$ ,  $A(y)$  не являются сечениями фигуры  $A$  с точки зрения геометрии, это проекции геометрических сечений на соответствующие подпространства.

**Замечание 2.** Не все сечения измеримого множества обязаны быть измеримыми. Пример такого множества и его неизмеримого сечения приведем на лекции.

**Теорема 1** (о сечениях измеримого по Лебегу множества в  $R^n$ ).

Пусть  $A \in A_n$ , (то есть  $A$  измеримо по Лебегу,  $A \in R^n = R^p \times R^q$ ).

Тогда почти для всех  $x \in R^p$  сечение  $A(x) \in A_q$  (то есть является измеримым по Лебегу) и справедливо равенство:

$$\mu_{p+q}A = \int_{R^p} \mu_q A(x) d\mu_p(x) \quad (*)$$

**Доказательство.** Будем устанавливать результат теоремы о сечениях поэтапно:

1.  $A$  – брус;
2.  $A$  – открытое множество;
3.  $A$  – пересечение открытых множеств,  $A$  – ограничено;
4.  $A$  – ограниченное множество нулевой меры;
5.  $A$  – ограниченное измеримое множество;
6.  $A$  – неограниченное измеримое множество.

Подробно приведем на лекции.