


Тема: Тропические болезни новая медико-биологическая проблема сибирского региона.

Выполнила:

студентка 5 группы 1 курса
стоматологического факультета
Очаковская Полина Алексеевна

Проверила:

К. б. н.
Логинова Виктория Михайловна

- Тропические болезни - неоднородная группа заболеваний, распространенных исключительно или преимущественно в тропических и субтропических поясах. Различают тропические болезни инфекционные (напр., сонная болезнь), связанные с недостатком питания (напр., квашиоркор), нападением ядовитых насекомых и др.
- 

Малярия




- инфекционное заболевание, передаваемое человеку при укусах малярийных комаров и сопровождающееся лихорадкой, ознобами, увеличением размеров селезёнки и печени. Болезнь вызывает малярийный плазмодий, поражающий эритроциты

Шистосомы – кровяные сосальщики


Их яйца имеют не крышечку, а шип




Sch. haematobium, *mansoni*, *japonicum*



Сонная болезнь (трипаносома)




ХОЛЕРА



2) Холера - острое инфекционное заболевание желудочно-кишечного тракта человека, вызываемое холерными вибрионами, с фекально-оральным механизмом передачи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- Чума (pestis) — острая инфекционная болезнь; характеризуется выраженной интоксикацией, лихорадкой, поражением лимфатических узлов, кожи и легких.





Ancylostoma duodenale



Necator americanus

Бругиоз




ВУХЕРЕРИОЗ




Lymphatic filariasis can be diagnosed by demonstrating the parasite (in this case *W. bancrofti*) in a blood film.

Клонорхоз



Клонорхоз - биогельминтоз, на ранней стадии проявляющийся аллергическими симптомами, а в хронической стадии протекающий с преимущественным поражением печени и поджелудочной железы.



Лоаоза




Лейшманиоз



Легочный сосальщик – *Paragonimus ringeri* (= *P. westermanii*)

– возбудитель парагонимоза




Распространение: Ц., В. и Ю.-В. Азия,
Африка, Ю. Америка.

Локализация: легкие человека, плотоядных
животных и свиней.



Продолжительность жизни - несколько лет.

Стронгилоидоз




Миграция личинок под кожей

ШИСТОСОМЫ





Гепатит А



Из всех достаточно многочисленных форм вирусных гепатитов гепатит А является наиболее распространенным. Хотя это заболевание характерно, в основном, для стран третьего мира с низким уровнем гигиены и санитарии, единичные случаи или вспышки заболевания гепатитом А могут наблюдаться даже в наиболее развитых странах.