

**ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

КАФЕДРА ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 2

«СТАН ЛІПІДНОГО ОБМІНУ

**ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ЙОГО КОМПОНЕНТІВ
У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ»**

**КАЛАШНИК В. О.
(НАУКОВИЙ КЕРІВНИК –
Д.МЕД.Н., ПРОФ. ВІЗІР В.А.)**

ФАКТОРИ ВПЛИВУ

ГЕНЕТИЧ
НІ

ПОВЕДІНКО
ВІ

ЕКОЛОГІЧ
НІ

ФІЗІОЛОГІЧ
НІ

МУЛЬТИФАКТОРНІ
НЕІНФЕКЦІЙНІ
ЗАХВОРЮВАННЯ

СЕРЦЕВО
-
СУДИННА
ПАТОЛОГ

ОНКОЛОГІЧ
НІ ХВОРОБИ

ХРОНІЧНІ
РЕСПІРАТОРНІ
ЗАХВОРЮВАН
НЯ

ЦУКРОВИ
Й ДІАБЕТ

ОСНОВНІ ТИПИ

**ЦЕРЕБРО-
ВАСКУЛЯРНА
ПАТОЛОГІЯ**

**СЕРЦЕВО-СУДИННІ
ЗАХВОРЮВАННЯ**

**АТЕРОСКЛЕРОТИЧН
ОГО**

ГЕНЕЗУ

**ЗАХВОРЮВАННЯ
МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН ТА
ПЕРИФЕРИЧНИХ АРТЕРІЙ**

ІХС

ГХ

НАЙГОЛОВНІШІ МЕТАБОЛІЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ПЕРЕДЧАСНОЇ СМЕРТІ

1. АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ

2. НАДЛИШКОВА МАСА ТІЛА


3. ОЖИРІННЯ

4. ГІПЕРГЛІКЕМІЯ

ТЮТЮНОПАЛІННЯ

**ГІПЕРХОЛЕСТЕРИН
ЕМІЯ**

**АРТЕРІАЛЬНА
ГІПЕРТЕНЗІЯ**



СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОЇ СМЕРТНОСТІ

МЕТА РОБОТИ

аналіз стану ліпідного обміну та
оцінка взаємозв'язку індикаторів,
що його характеризують у хворих
на гіпертонічну хворобу

Критерії включення


- вік понад 18 років
- верифікована ГХ
- підписана інформована згода

Критерії виключення


-вторинні АГ

-наявність патологічних станів або прийом препаратів, здатних впливати на метаболізм холестерину

Демографічна характеристика хворих на ГХ



Рівень системного АТ у хворих на ГХ



Клініко-анамнестична характеристика хворих на ГХ




МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ
(в т.ч. вимірювання АТ)

2. ЛАБОРАТОРНІ
(визначення показників ліпідного спектру)

3. СТАТИСТИЧНІ
(дані наведені у вигляді середньої арифметичної та стандартної помилки, 95% довірчого інтервалу, а також коефіцієнта рангової кореляції Пірсона)

Характеристика показників ліпідного спектру у хворих на ГХ



Взаємозв'язок показників ліпідного спектру та АТ у хворих на ГХ

	ЗХ	ЛПНЩ	ЛПВЩ	ТГ	ЛПДНЩ	ІА	САТ	ДАТ
ЗХ		$r=0.92$ $P<0.001$						
ЛПНЩ	$r=0.92$ $P<0.001$					$r=0.58$ $P<0.05$		
ЛПВЩ						$r=0.59$ $P<0.05$		
ТГ					$r=0.99$ $P<0.001$	$r=0.59$ $P<0.05$		
ЛПДНЩ				$r=0.99$ $P<0.001$		$r=0.59$ $P<0.05$		
ІА		$r=0.58$ $P<0.05$	$r=0.59$ $P<0.05$	$r=0.59$ $P<0.05$	$r=0.59$ $P<0.05$			
САТ								$r=0.69$ $P<0.001$
ДАТ							$r=0.69$ $P<0.001$	

ВИСНОВОК

В популяції хворих на гіпертонічну хворобу середньої вікової категорії з ізольованою систолічною артеріальною гіпертензією першого ступеня та наявністю мікст-дисліпідемії найбільш значимими були сильні позитивні кореляційні зв'язки загального холестерину та холестерину ліпопротеїдів низької щільності, холестерину ліпопротеїдів дуже низької щільності та тригліцеридів, так само як і прямий взаємозв'язок середньої сили показників системного артеріального тиску, тоді як рівень індексу атерогенного потенціалу сироватки крові рівною мірою залежав як від про- так і антиатерогенних компонентів ліпідного спектру

ДЯКУЮ

ЗА

УВАГУ!