Казанский государственный медицинский университет
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии

Резекция желудка

Докладчики:
Суриков А. 1305

Руководитель:
Доцент, зав. Кафедрой,
Баширов Ф.В.

Казань, 2015

Операция по удалению части желудка. Ее принцип состоит в удалении части органа и восстановлении пищеварительного канала путем формирования анастомоза между желудочной культей и двенадцатиперстной или тощей кишки.



Желудок, ventriculus (gaster) и двенадцатиперстная кишка, duodenum. Передняя стенка желудка



Цель резекции желудка различна в зависимости от показаний для операции. Два наиболее частых заболевания, по поводу которых она производится,- это карцинома и пептическая язва.

Цель операции при раке желудка

- распространение в пределах стенки желудка;
- непосредственный переход на соседние с желудком органы;
- лимфогенные метастазы;
- гематогенные метастазы;
- канцероматозная имплантация брюшины.

Цель операции при пептической язве

С одной стороны, в ходе этой операции необходимо удалить из организма болезненный, чреватый опасностями патологический участок — язву, а с другой стороны, следует предотвратить рецидив язвы на сохраняющейся здоровой желудочно-кишечной стенке.

Ход операции



MedUniver.com
все по медицине...

1 этап резекции желудка — мобилизация:




5
4
1
2
3
а
1
4
6
3
б

а

б

а



б

2 этап резекции желудка — отсечение:



Бильрот 1





а



б


a









Рис. 12-142. Прямой гастродуоденальный анастомоз, а — по *Пеану*, б — по *Бильроту*, в — по *Ридигеру*, г — по *Бильроту*, д — по *Хабереру*, е — по *Хабереру-Финнею*; ж — по *Кохеру*. (Из: Березов Ю.Е. Хирургия рака желудка. — М., 1976; Ганичкин А.М., Резник С.Д. Методы восстановления желудочно-кишечной непрерывности при резекции желудка. — Л., 1973.)

Бильрот 2





3 этап закрытие культи двенадцатиперстной кишки





а



б

Спасибо за внимание!