


Экстренная реанимационная помощь


1 этап: Диагностика.



- Проверить наличие сознания (окликнуть пострадавшего, потрясти за плечо).
 - Проверить наличие дыхания (на слух, при помощи зеркала).
-



- Проверить пульс на сонной артерии.




- Проверить реакцию зрачка на свет.
-

Определение состояния клинической смерти.

- Отсутствие дыхания.
 - Отсутствие реакции зрачка на свет.
 - Отсутствие пульса на сонной артерии.
 - Отсутствие сознания.
-

Состояние биологической смерти:

- Отсутствие дыхания.
- Отсутствие реакции зрачка на свет.
- Отсутствие пульса на сонной артерии.
- При надавливании пальцами сбоку на глаз зрачок принимает форму «кошачьего глаза».
- Появление на теле трупных пятен.



Оживление уже невозможно.

2 этап:

Подготовительный этап.



- Уложить (перевернуть) пострадавшего на спину на твердую ровную поверхность.
 - Расстегнуть воротник.
 - Ослабить пояс, галстук.
-

3 этап: Реанимация.

- Прекардиальный удар
 - Непрямой массаж сердца
 - Искусственная вентиляция легких
-

ПРЕКАРДИАЛЬНЫЙ УДАР

Цель – сильно сотрясти грудную клетку, тем самым запустить остановившиеся сердце.


Последовательность действий:

- 1) Убедиться в отсутствии пульса
- 2) Резкий, короткий удар ребром сжатой в кулак ладони на 2-3 см выше мечевидного отростка
- 3) Проверка пульса:



да – ИВЛ нет – НМС


! Только один раз.

Техника выполнения прекардиального удара



Непрямой массаж сердца





- Руки выпрямлены в локтях.
- В зависимости от возраста пострадавшего (комплексии) приложение силы : двумя руками, одной рукой (одним пальцем).


Ошибки при проведении массажа сердца.

- Неправильное положение рук на груди.
 - Недостаточная глубина прогибания грудины.
 - Недостаточно мощный, короткий толчок.
 - Не ослаблен пояс.
-



Искусственная вентиляция легких

Техника выполнения:

- Обеспечить проходимость дыхательных путей
- Запрокинуть голову
- Сделать вдох в легкие:
 - 1) изо рта в рот
 - 2) изо рта в нос



ВЫПОЛНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ



Ошибки при проведении ИВЛ:


- Незапрокинута (недостаточно запрокинута) голова.
 - Недостаточный объем вдуваемого воздуха.
 - Частота вдохов менее 8 раз в минуту.
 - Плохо зажат нос при методе «изо рта в рот».
-



Выполнение ИВЛ и непрямого массажа сердца ОДНИМ спасателем

2 вдоха + 15 надавливаний

Выполнение
ИВЛ и
непрямого
массажа сердца
двумя
спасателями
1 вдох + 5 надавливаний





Вызвать скорую
помощь (тел. «03»
или «112»)

