

# USPTF. НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТИНОВ.

**РАБОТА :СТУДЕНТКИ 4 КУСА ,15  
ПОДГРУППЫ**

**СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»  
БИНОГЕРОВОЙ ЗУХРЫ ХЫЗЫРОВНЫ**



**ВПЕРВЫЕ !!!!**

**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ  
НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ  
ПАЦИЕНТАМ БЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ.**

# НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТИНОВ

## ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ

Класс  
В

Рекомендовано применение **низких и средних доз** статинов для пациентов от 40 до 76 лет без анамнеза ИБС. Но имеющих один или более факторов риска (дислипидемия, диабет, гипертензия, курение), а также для тех, кто имеет **более чем 10%** риск развития нежелательного сердечно-сосудистого события (ИМ или инсульт) в течении последующих 10 лет.

# НЕОБХОДИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!!!

класс  
С

Низкие или средние дозировки статинов могут быть **обсуждены** с пациентами возраста от 40-75 лет, кто не имеет анамнеза ИБС, но имеет один или более факторов риска, и **от 7,5 % до 10%** риска развития нежелательного сердечно –сосудистого события в течении последующих 10 лет

Если услуга предоставляется, пациенты должны быть осведомлены о неопределенности в отношении баланса выгоды и наносимого вреда!!!

Класс  
I statement

Недостаточно доказательств о преимуществах или рисках назначения статинов пациентам старше 76 лет и более.

# USPTF ОТМЕЧАЕТ !!!

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НЕ ПРИМЕНИМЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ **ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО РИСКА**, НАПРИМЕР ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ ИЛИ ДЛЯ ТЕХ ПАЦИЕНТОВ У КОТОРЫХ УРОВЕНЬ ЛПНП ПРЕВЫШАЕТ **(4.9 ММОЛЬ/Л)**