

USPTF. НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТИНОВ.

**РАБОТА :СТУДЕНТКИ 4 КУРСА ,15
ПОДГРУППЫ**

**СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»
БИНОГЕРОВОЙ ЗУХРЫ ХЫЗЫРОВНЫ**



ВПЕРВЫЕ !!!!

**РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ
НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
ПАЦИЕНТАМ БЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ.**

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАТИНОВ

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕКОМЕНДАЦИЯХ

Класс
В

Рекомендовано применение **низких и средних доз** статинов для пациентов от 40 до 76 лет без анамнеза ИБС. Но имеющих один или более факторов риска (дислипидемия, диабет, гипертензия, курение), а также для тех, кто имеет **более чем 10%** риск развития нежелательного сердечно-сосудистого события (ИМ или инсульт) в течении последующих 10 лет.

НЕОБХОДИМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!!!

класс
С

Низкие или средние дозировки статинов могут быть **обсуждены** с пациентами возраста от 40-75 лет, кто не имеет анамнеза ИБС ,но имеет один или более факторов риска , и **от 7,5 % до 10%** риска развития нежелательного сердечно –сосудистого события в течении последующих 10 лет

Если услуга предоставляется, пациенты должны быть осведомлены о неопределенности в отношении баланса выгоды и наносимого вреда!!!

Класс
I statement

Недостаточно доказательств о
преимуществах или рисках назначения
статинов пациентам старше 76 лет и более.

USPTF ОТМЕЧАЕТ !!!

НОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ **НЕ ПРИМЕНИМЫ** ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ **ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО РИСКА**, НАПРИМЕР ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ С СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ
ИЛИ ДЛЯ ТЕХ ПАЦИЕНТОВ У КОТОРЫХ УРОВЕНЬ ЛПНП
ПРЕВЫШАЕТ **(4.9 ММОЛЬ/Л)**