

Моноклональные антитела в фармакотерапии бронхиальной астмы

Буздавина Т. гр460

▶ БА является гетерогенным заболеванием, характеризующимся:

- хроническим воспалением дыхательных путей
- свистящие хрипы
- одышка
- заложенность в груди
- кашель



Таблица 1. Классификация фенотипов БА

По ведущему триггеру	По клиническим проявлениям	По характеру воспаления
<ol style="list-style-type: none">1. Аллергический2. Неаллергический3. Аспириновый4. Инфекционно-зависимый5. Индуцированный физической нагрузкой	<ol style="list-style-type: none">1. Предастма у детей: свистящее дыхание, провоцируемое ОРВИ свистящее дыхание, провоцируемое различными триггерами2. С частыми обострениями3. С необратимой обструкцией	<ol style="list-style-type: none">1. Эозинофильный2. Нейтрофильный

Поддерживающая терапия БА

Контроль над клиническими проявлениями БА достигается благодаря противовоспалительному действию препаратов, к которым относятся следующие ЛС:

- ингаляционные ГКС (будесонид, флутиказона пропионат, циклесонид, мометазона фууроат, беклометазона дипропионат);
- антилейкотриеновые препараты (АЛТР) (монтелукаст и зафирлукаст);
- ингаляционные бета-2-агонисты длительного действия (ДДБА) в комбинации с ингаляционными ГКС (будесонид/формотерол, флутиказона пропионат/салметерол, беклометазона дипропионат/формотерол);
- теофиллин замедленного высвобождения;
- кромоны (кромоглициевая кислота, недокромил натрия) (в настоящее время применяются все реже в связи с недостаточной эффективностью и неудобством применения);
- системные ГКС (метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон);
- моноклональные антитела к иммуноглобулинам класса E (IgE) (омализумаб)

Ступенчатый подход к выбору фармакологического лечения БА

Таблица 2. Ступенчатый подход к долговременному контролю бронхиальной астмы (GINA, 2010)

Контроль	Ступень 1 (интермиттирующее течение)	Ступень 2 (среднетяжелое течение: симптомы от 1 р/нед до 1 р/день)	Ступень 3 (среднетяжелое течение: ежедневные симптомы)	Ступень 4 (тяжелое течение)	Ступень 5 (регулярный прием пероральных ГКС)
Обучение пациентов, контроль факторов окружающей среды					
Ингаляционный бета-2-агонист быстрого действия по потребности					
Контролирующие препараты выбора	-	Ингаляционные ГКС низкие дозы	Ингаляционные ГКС низкие дозы + ДДБА	Ингаляционные ГКС средние или высокие дозы + ДДБА	Предыдущая терапия + пероральный прием ГКС (минимальная доза)
	-	АЛТР	Ингаляционные ГКС средние или высокие дозы	Ингаляционные ГКС средние или высокие дозы + ДДБА + АЛТР	Предыдущая терапия + пероральный прием ГКС (минимальная доза) + моноклональные анти-IgE-антитела
	-		Ингаляционные ГКС низкие дозы + АЛТР	Ингаляционные ГКС средние или высокие дозы + ДДБА + ПТ	
	-		Ингаляционные ГКС низкие дозы + ПТ		

ГКС – глюкокортикостероиды; АЛТР – антилейкотриеновый препарат; ДДБА – ингаляционные бета-2-агонисты длительного действия; ПТ – пролонгированный теофиллин.

Моноклональные антитела

- Антитела IgE: омализумаб
- Антитела к ИЛ-5: меполизумаб, реслизумаб
- Антитела к рецептору ИЛ-5: бенрализумаб
- Антитела к ИЛ-13: лебрикизумаб
- Антитела к рецептору ИЛ-4- дупилумаб





Рис. 1. Активация воспалительных путей при БА. ИФН-γ – интерферон-γ, ТСЛП – тимусный стромальный лимфопоэтин, ФНО-α – фактор некроза опухолей α, CRTH₂ – хемоаттрактант рецептор-гомологичной молекулы Th2-хелперов, DC – дендритные клетки, IgE – иммуноглобулин E, ILC2 – врожденные лимфоидные клетки 2-го типа. Здесь и на рис. 4: c-Kit – рецепторная тирозинкиназа, CXCR2 – растворимый рецептор нейтрофилов ИЛ-8.


Омализумаб (Ксолар)


- это IgG1 гуманизированное антитело, которое связывает IgE и предупреждает прикрепление IgE к тучным клеткам и базофилам
- снижает высвобождения медиаторов аллергического ответа.

Человеческие моноклональные анти-IgE антитела: Омализумаб (Ксолар)



При лечении омализумабом пациентов с atopической БА отмечается уменьшение количества FcεRI-рецепторов на поверхности базофилов





- Показания: атопическая БА, хроническая идиопатическая крапивница

Применение при беременности возможно только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода


Побочные действия: Анафилаксия 39% отмечались после первой дозы, 19% — после второй, 10% — после третьей, Лихорадка, артралгия и сыпь

Со стороны крови: тяжелая тромбоцитопения

Со стороны кожи и подкожных тканей: выпадение волос

Антитела к ИЛ-5

- В основе эозинофильной БА лежит воспаление, характеризующееся продукцией интерлейкина-5, который играет ключевую роль в дифференцировке, выживаемости, миграции и активации эозинофилов. В связи с этим ИЛ-5 является привлекательной терапевтической мишенью при эозинофильной БА.



Меполизумаб

-это IgG4 гуманизированное антитело, которое обладает высоким сродством к ИЛ-5 и селективно связывается с ним, тем самым предотвращая его взаимодействие с ИЛ-5R α , экспрессируемым эозинофилами и, в меньшей степени, базофилами

Рекомендован для лечения больных с неконтролируемой БА в возрасте 12 лет и старше

Побочные реакции: отечность лица, языка, рта, обмороки, головокружение, сыпь

Сравнительный анализ внутривенного и подкожного введения меполизумаба показал их сопоставимую эффективность в снижении числа тяжелых обострений, госпитализаций и качество жизни больных с тяжелой эозинофильной астмой.





Рис. 2. Механизм действия меполизумаба. β c – поверхностный рецептор эозинофилов ИЛ-5.



Реслизумаб

- ▶ это IgG4 гуманизированное антитело, которое нейтрализует циркулирующие ИЛ-5.


Рекомендован: для больных старше 18 лет с тяжелой эознофильной БА.

Побочные эффекты: редко анафилаксия

- ▶ Первые результаты показали, что применение реслизумаба эффективно снижает число обострений, а также улучшает показатели проходимости бронхов и качества жизни у больных с тяжелой неконтролируемой БА.



Тяжёлая астма, неконтролируемая, несмотря на оптимальную терапию в соответствии с руководствами, и с тяжёлыми обострениями




Бенрализумаб

-АТ к рецепторам ИЛ-5

в России его зарегистрировали 25 апреля 2019 г. в качестве дополнительной поддерживающей терапии у пациентов с тяжелой эозинофильной БА.

Бенрализумаб связывается с ИЛ-5R α , находящимся на поверхности эозинофилов и базофилов




Бенрализумаб был одобрен FDA для пациентов в возрасте 12 лет и старше (в России с 18 лет) с неконтролируемой тяжелой БА с эозинофильным фенотипом

Дупилумаб

-представляет собой полностью человеческое МАТ к ИЛ-4R α , которое ингибирует передачу сигналов ИЛ-4 и ИЛ-13 и нацелено против рецепторов 1-го типа (ИЛ-4R α / γ c) и 2-го типа (ИЛ-4R α /ИЛ-13R α 1).

Дупилумаб одобрен FDA и EMA в 2018 г. для применения в качестве препарата дополнительной поддерживающей терапии у пациентов в возрасте 12 лет и старше с тяжелой БА, сопровождающейся воспалительной реакцией 2-го типа



Лебрикизумаб

-МАТ к ИЛ-13

-обладает эффективностью при так называемой «Th2-high» БА, для которой характерна повышенная экспрессия ИЛ-13-индуцируемых генов, к которым относится и ген периостина (белка внеклеточного матрикса). При оценке эффективности лебрикизумаб способствовал значительному улучшению функции легких у пациентов с умеренно тяжелым течением БА и высоким уровнем периостина в сыворотке крови.

На стадии клинической разработки

Биологические препараты, одобренные для применения при тяжелой БА (адаптировано из [12, 14])

Биопрепарат	Биологическая мишень	Критерии включения	Способ введения	Показание	Биомаркеры	Применение, клинические результаты
Омализумаб	IgE	Общий IgE сыворотки 30–1500 МЕ/мл, положительные кожные скарификационные пробы	Подкожно	Аллергическая БА	Эозинофилы крови, FeNO, периостин сыворотки, аллергенспецифический IgE	Дозирование на основании уровня IgE и массы тела; от 75 до 1200 мг каждые 2/4 нед; профилактика сезонных обострений; ранняя БА
Меполизумаб	ИЛ-5	Эозинофилы крови ≥ 150 клеток/мкл, эозинофилы мокроты $> 3\%$	Подкожно	Эозинофильная БА	Эозинофилы крови, эозинофилы мокроты	100 мг каждые 4 нед; тяжелая БА; хороший профиль безопасности; хронический синусит; полипы носа; эффект снижения дозы ГКС (steroid-sparing effect)
Реслизумаб	ИЛ-5	Эозинофилы крови ≥ 400 клеток/мкл, эозинофилы мокроты $> 3\%$	Внутривенно	Эозинофильная БА	Эозинофилы крови	3 мг/кг массы тела каждые 4 нед; расчет дозы по массе тела; тяжелая БА; хронический синусит; полипы носа; нет формы для подкожного введения; индивидуальное дозирование
Бенрализумаб	ИЛ-5R α	Эозинофилы крови ≥ 300 клеток/мкл; ≥ 1 обострения за последний год	Подкожно	Эозинофильная БА	Эозинофилы крови	30 мг каждые 4 нед первые 3 дозы, затем каждые 8 нед; уникальный механизм действия; тяжелая БА
Дупилумаб	ИЛ-4R α /ИЛ-13R $\alpha 1$	Эозинофилы крови ≥ 150 клеток/мкл; ≥ 1 обострения за последний год	Подкожно	Эозинофильная БА	Эозинофилы крови, FeNO	Начальная доза 400 или 600 мг, далее по 200 или 300 мг каждые 2 нед; можно применять в домашних условиях; сопутствующий атопический дерматит; эффект снижения дозы ГКС (steroid-sparing effect); аспиринотая БА

Обозначения: FeNO – фракция оксида азота в выдыхаемом воздухе, IgE – иммуноглобулин E.

▶ **Преимущество :**

- возможность селективного ингибирования цитокинов и воздействие на патогенетические звенья, не доступные воздействию ГКС.

▶ **Недостатки**

— выработка антител к препарату, побочные эффекты, включая анафилаксию и дисбаланс иммунитета (иммунодепрессант), что может привести к сепсису или развитию онкологического заболевания.

Иммунодепрессанты весьма токсичны и используются лишь при гипериммунных реакциях с тяжелым и средней тяжести течением, ***когда возможности иной терапии исчерпаны, а риск прогрессирования болезни превосходит риск иммуносупрессии.***

Назначение иммунодепрессантов производится только специалистом в соответствующей области медицины

- ▶ Есть данные об увеличении риска развития паразитарных инфекций при лечении препаратами, действие которых направлено на подавление эозинофилов.




Рис. 4. Алгоритм правильного выбора биологического препарата в зависимости от эндотипа тяжелой БА.

Литература:

- ▶ cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-v-lechenii-bronhialnoy-astmy
- ▶ umedp.ru/articles/omalizumab_v_terapii_tyazheloy_bronkhialnoy_astmy.html
- ▶ cyberleninka.ru/article/n/targetnaya-terapiya-pri-tyazheloy-eozinofilnoy-bronhialnoy-astme-vybor-pravilnogo-biologicheskogo-preparata/viewer