
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ

фАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Влияние курения на внутриутробное развитие плода



Выполнила: Васильева Алина Группа 108-2

Содержание

- □Общее значение опасности сигаретного дыма на плод.
- □Сокращение веса плода.
- □Способ проникновения вредных веществ.
- □Последствия.

Курение в тот период, когда мать вынашивает своего малыша, негативно отражается на здоровье обоих. Но курение во время беременности, в первую очередь, влияет на развитие плода, потому что поступающие вредные вещества вместе с сигаретным дымом более опасны для развивающегося и быстрорастущего организма.



Влияние курения на развитие плода происходит путем проникновения вредных веществ через плаценту. При каждой затяжке сигаретой возникает спазм сосудов, в том числе и маточно-плацентарных, который держится на протяжении 30 минут. Постепенно структура плаценты у курящей матери изменяется, уменьшаясь по форме и объему, а кровоток снижается за счет стабильного сужения сосудов. Это вызывает нарушение питания будущего малыша и гипоксию.



Список литературы

http://rd1.web-registratura.ru/?page_id=332

http://www.sweli.ru/beremennost/planirovanie/planirovanie-beremennosti/vliyanie-kureniya-na-beremennost-i-razvitie-ploda-buduschego-rebenka.html



Спасибо за внимание!